



۱ اگر $\tan(\alpha + 25^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ باشد، مقدار $\text{Cotg}(25^\circ - \alpha)$ کدام است؟

$$\frac{5\sqrt{3}}{2} \quad (4)$$

$$\frac{5\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{15} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{5} \quad (1)$$

۲ معادلهٔ مثلثاتی $\tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \tan 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \text{Cotg}\left(\frac{2\pi}{2}\right)$ چند جواب در بازهٔ $[0, \pi]$ دارد؟

$$6 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۳ در بازه $[0, \pi]$ معادله مثلثاتی $\sin 2x = \cos 2x$ چند جواب دارد؟

$$5 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۴ معادله مثلثاتی $\cos 2x + \cos 3x = 0$ چند جواب در بازه $[0, \pi]$ دارد؟

$$5 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۵ مجموع جواب‌های معادله $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 0$ در بازه $(0, 2\pi)$ کدام است؟

$$\frac{9\pi}{4} \quad (4)$$

$$\frac{7\pi}{4} \quad (3)$$

$$\frac{5\pi}{2} \quad (2)$$

$$\frac{2\pi}{2} \quad (1)$$

۶ اختلاف جواب‌های معادله مثلثاتی $\cos 2x = 2\sin x - 1$ که در بازه $[0, \pi]$ قرار دارند، کدام است؟

$$\frac{2\pi}{3} \quad (4)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$\frac{5\pi}{6} \quad (1)$$

۷ مجموع جواب‌های معادله $\cos 2x + \sin^2 x = 0$ در بازه $[-2\pi, \pi]$ کدام است؟

$$-4\pi \quad (4)$$

$$-3\pi \quad (3)$$

$$-\pi \quad (2)$$

$$\text{صفر} \quad (1)$$

۸ معادله $\sin x \cos x + \frac{1}{2}\sin^2 x = \frac{1}{2}\cos^2 x$ در بازه $[-\pi, \pi]$ چند جواب دارد؟

$$8 \quad (4)$$

$$6 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۹ اگر $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$ و $\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{1-m}{2+m}$ باشد، مجموعه مقادیر m کدام است؟


$$(-1, 2) \quad (4)$$

$$(-1, 2] \quad (3)$$

$$(-2, 1] \quad (2)$$

$$(-2, 1) \quad (1)$$

۱۰ شکل مقابل، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \cos x + b$ را نشان می‌دهد. مقدار $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ کدام است؟



$-\frac{11}{2}$ (۴)

$-\frac{1}{2}$ (۳)

$\frac{11}{2}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۱۱ جواب‌های معادله‌ی مثلثاتی $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2x$ کدام است؟

$x = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$ (۲)

$x = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$ (۱)

$x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}, K \in \mathbb{Z}$ (۴)

$x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, K \in \mathbb{Z}$ (۳)

۱۲ مجموع جواب‌های معادله‌ی مثلثاتی $\tan(3x) \tan(x) = 1$ در بازه‌ی $[\pi, 2\pi]$ ، کدام است؟


$\frac{11\pi}{2}$ (۴)

$\frac{9\pi}{2}$ (۳)

6π (۲)

5π (۱)

۱۳) شکل روبه‌رو، قسمتی از نمودار تابع $y = a + b \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ است. b کدام است؟



$\frac{3}{2}$ (۲)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱)

۲ (۴)

$\sqrt{3}$ (۳)

۱۴) جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ ، به کدام صورت است؟

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۳)

$k\pi + \frac{\pi}{3}$ (۲)

$k\pi - \frac{\pi}{3}$ (۱)

۱۵) جواب کلی معادله مثلثاتی $\frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \sqrt{3}$ ، به کدام صورت است؟

$k\pi - \frac{\pi}{6}$ (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{6}$ (۳)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$ (۲)

$\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$ (۱)

۱۶) جواب کلی معادله مثلثاتی $2 \cos 2x = \cot x (4 \sin x + \tan x)$ ، کدام است؟

$2k\pi \pm \frac{2\pi}{6}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$ (۳)

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۲)

$k\pi - \frac{\pi}{3}$ (۱)

۱۷) جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos 3x \sin(3\pi - x) - \sin 3x \cos(\pi + x) = \cos \frac{3\pi}{2}$ ، کدام است؟

$k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$ (۳)

$\frac{k\pi}{2}$ (۲)

$\frac{k\pi}{4}$ (۱)

۱۸) مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی $\sin\left(x + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(x - \frac{3\pi}{8}\right) = 1$ ، در بازه $[0, 2\pi]$ برابر کدام است؟

$\frac{7\pi}{4}$ (۴)

$\frac{3\pi}{2}$ (۳)

$\frac{5\pi}{4}$ (۲)

$\frac{3\pi}{4}$ (۱)

۱۹) جواب کلی معادله مثلثاتی $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{4}$ ، کدام است؟

$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۴)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۳)

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (۲)

$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ (۱)

۲۰ مجموع جواب‌های معادله‌ی مثلثاتی $۱ = \sin x \sin \left(\frac{۳\pi}{۲} - x \right)$ ، در بازه‌ی $[۰, ۲\pi]$ ، کدام است؟

۵π ۴

۲π ۳

۳π ۲

$\frac{۵\pi}{۲}$ ۱

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

$$\alpha + 25^\circ = x \Rightarrow y + x = 60^\circ \Rightarrow y = 60^\circ - x$$

$$25^\circ - \alpha = y$$

$$\Rightarrow \tan(y) = \tan(60^\circ - x) = \frac{\tan 60^\circ - \tan x}{1 + \tan 60^\circ \tan x} = \frac{\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \frac{3}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{5}$$

$$\Rightarrow \tan(25^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{3}}{5} \Rightarrow \cot(25^\circ - \alpha) = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

$$\tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \tan(-\pi + 2x) = 0 \Rightarrow \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \tan(2x) = 0 \Rightarrow \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \tan(-2x)$$

$$\Rightarrow 2x - \frac{\pi}{3} = k\pi - 2x \Rightarrow 4x = k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{4} + \frac{\pi}{12} \Rightarrow x = \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{9\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}$$

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

$$\cos 2x = \sin 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$$

$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - 2x \Rightarrow 4x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{4} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{8} \quad k \in \{0, 1, 2\} \\ 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} + 2x \Rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{ندارد} \end{cases}$$

پس این معادله در فاصله $[0, \pi]$ دارای سه جواب $\left\{\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}\right\}$ است.

$$\cos 2x = -\cos 2x \Rightarrow 2x = 2k\pi \pm (\pi - 2x)$$

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

$$2x = 2k\pi + \pi - 2x \Rightarrow x = \frac{2k\pi + \pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} k=0 & x = \frac{\pi}{4} \\ k=1 & x = \frac{3\pi}{4} \\ k=2 & x = \pi \end{cases}$$

$$2x = 2k\pi - \pi + 2x \Rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} k=1 & x = \pi \\ k=2 & x = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$


گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = 2k\pi - \frac{\pi}{3} - x \Rightarrow 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi - \frac{\pi}{6} \Rightarrow \begin{cases} x = \pi - \frac{\pi}{6} \\ x = 2\pi - \frac{\pi}{6} \end{cases} \\ x - \frac{\pi}{3} = 2k\pi + \frac{\pi}{3} + x \Rightarrow 0 = 2k\pi + \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \text{ندارد} \end{cases}$$

$$\text{جمع} = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ۶



$$\begin{aligned} \cos 2x &= 3 \sin x - 1 \Rightarrow 1 - 2 \sin^2 x = 3 \sin x - 1 \\ 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 &= 0 \Rightarrow \sin x = \begin{cases} -2 & \text{غ ق} \\ \frac{1}{2} & \text{ق ق} \end{cases} \\ \Rightarrow x &= \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \Rightarrow \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ۷

$$(1 - 2 \sin^2 x) + \sin^2 x = 0 \Rightarrow \sin^2 x = 1 \Rightarrow \sin x = \pm 1 \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

جواب‌های بازه $[-3\pi, \pi]$ عبارت‌اند از $-\frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ که مجموع آن‌ها برابر -4π است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ۸

$$\sin x \cos x + \frac{1}{2} \sin^2 x = \frac{1}{2} \cos^2 x \Rightarrow \sin x \cos x = \frac{1}{2} (\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$\Rightarrow \sin 2x = \cos 2x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} - 2x \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \Rightarrow k = -2, -1, 0, 1 \Rightarrow \text{معادله ۴ جواب دارد} \\ 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} + 2x \otimes \end{cases}$$

راه حل دوم:

$$\left. \begin{aligned} \sin 2x &= \cos 2x \Rightarrow \tan(2x) = 1 \\ -\pi \leq x \leq \pi &\Rightarrow \underbrace{-2\pi \leq 2x \leq 2\pi}_{\text{۲ دور}} \end{aligned} \right\} \text{تعداد جواب} = 2 \times 2 = 4$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ۹

$$-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4} \Rightarrow 0 < \frac{\pi}{4} - x < \frac{\pi}{2}$$

پس کمان موردنظر در ربع اول است در این بازه تانژانت مثبت است.

پس:

$$\frac{1-m}{2+m} > 0 \Rightarrow -2 < m < 1$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ۱۰

$$\left. \begin{aligned} \max &= |a| + b = 3 \\ \min &= -|a| + b = -7 \end{aligned} \right\} \Rightarrow b = -2, |a| = 5$$

اما تابع در $x = 0$ ماکزیمم دارد، پس $a > 0$ است.

$$\Rightarrow f(x) = 5 \cos x - 2 \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5 \cos \frac{\pi}{2} - 2 = \frac{5}{2} - 2 = \frac{1}{2}$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای حل معادله مثلثاتی باید ابتدا نسبت‌ها را به کمک فرمول بسط داده و ساده کنیم:

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin x \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \cos x + \cos x \times \frac{1}{2} - \sin x \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 2x \Rightarrow \cos x = \cos 2x$$

$$\Rightarrow 2x = 2k\pi \pm x \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + x \Rightarrow x = 2k\pi \\ 2x = 2k\pi - x \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} \end{cases}$$

جواب $\frac{2k\pi}{3}$ جواب $2k\pi$ را نیز شامل می‌شود، بنابراین $\frac{2k\pi}{3}$ قابل قبول است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

$$\tan 2x = \frac{1}{\tan x} \Rightarrow \tan 2x = \cot x \xrightarrow{\cot x = \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} \tan 2x = \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$\Rightarrow 2x = k\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Rightarrow 3x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$$

و جواب‌های قابل قبول در بازه داده شده عبارتند از:

$$x = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$$

$$x_1 = \frac{\pi}{6}, x_2 = \frac{5\pi}{6}, x_3 = \frac{7\pi}{6}, x_4 = \frac{11\pi}{6}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6\pi$$

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. با توجه به شروع صعودی به ازای $x > 0$ پس $b > 0$ بنابراین برای آنکه تابع ماکزیمم

شود باید $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ باشد، در نتیجه $x = \frac{\pi}{6}$ است یعنی تابع از نقطه $\left(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\right)$ می‌گذرد.

$$\left(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\right) \Rightarrow a + b \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Rightarrow a + b = \sqrt{3} \Rightarrow a = \sqrt{3} - b$$

$$f(\pi) = -\frac{3}{2} \Rightarrow a + b \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2} \Rightarrow a - \frac{\sqrt{3}}{2}b = -\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow b + \frac{\sqrt{3}}{2}b = \sqrt{3} + \frac{3}{2} \Rightarrow b \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{3} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \Rightarrow b = \sqrt{3}$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{روش اول:} \left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3}\right) \left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) \left(\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{4}\cos^2 x - \frac{3}{4}\sin^2 x$$

$$\Rightarrow \cos^2 x - 3\sin^2 x = -2 \Rightarrow 1 - \sin^2 x - 3\sin^2 x = -2 \Rightarrow 4\sin^2 x = 3 \Rightarrow \sin^2 x = \frac{3}{4}$$

$$\sin^2 x = \sin^2 \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\text{می‌دانیم:} \cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\text{پس:} \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \left[\cos\left(x + \frac{\pi}{3} + x - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{3} - x + \frac{\pi}{3}\right) \right] = -\frac{1}{2}$$

داریم

$$\cos 2x + \cos \frac{2\pi}{3} = -1 \Rightarrow \cos 2x - \frac{1}{2} = -1 \Rightarrow \cos 2x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)} = \sqrt{3} \Rightarrow \tan(2x) = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow 2x = k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$$

$$2 \cos 2x = \cot x (2 \sin x + \tan x)$$

$$\Rightarrow 2 \cos 2x = 2 \sin x \cot x + \cot x \tan x$$

$$\Rightarrow 2(2 \cos^2 x - 1) = 2 \cos x + 1 \Rightarrow 4 \cos^2 x - 2 \cos x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2 \cos x + 1)(2 \cos x - 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{3}{2} \text{ غ ق} \\ \cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

$$\cos 2x \sin(\pi - x) - \sin 2x \cos(\pi + x) = \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \cos 2x \cdot \sin(\pi - x) - \sin 2x \cdot (-\cos x) = 0$$

$$\Rightarrow \cos 2x \cdot \sin x + \sin 2x \cdot \cos x = 0 \Rightarrow \sin(2x + x) = 0 \Rightarrow \sin 3x = 0 \Rightarrow$$

$$3x = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{3}$$

$$\sin \theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{\lambda}\right) = \cos\left(x - \frac{2\pi}{\lambda}\right) \Rightarrow 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{\lambda}\right) = 1 \Rightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{\lambda}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} x + \frac{\pi}{\lambda} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ x + \frac{\pi}{\lambda} = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{\lambda} \\ x = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{\lambda} \end{cases} \xrightarrow{\text{جمع}} \pi - \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. روش اول: فرمول ضرب به جمع: ۱۹

$$\frac{1}{2} \left(\cos 2x + \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{4} \rightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

روش دوم:

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{2} (\cos^2 x - \sin^2 x) = \frac{1}{4}$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ۲۰

$$2 \sin x \sin \left(\frac{2\pi}{3} - x \right) = 1 \Rightarrow 2 \sin x (-\cos x) = 1 \Rightarrow -2(\sin x \cos x) = 1$$

$$\Rightarrow -2 \sin 2x = 1 \Rightarrow \sin 2x = \left(-\frac{1}{2} \right) \Rightarrow \sin (2x) = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi - \frac{\pi}{6} \\ 2x = 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = k\pi - \frac{\pi}{12} \\ x_2 = k\pi + \frac{5\pi}{12} \end{cases}$$

k	۰	۱	۲
x_1	$\times$	$\pi - \frac{\pi}{12}$	$2\pi - \frac{\pi}{12}$
x_2	$\frac{5\pi}{12}$	$\pi + \frac{5\pi}{12}$	$\times$

$$\text{مجموع} = \pi - \frac{\pi}{12} + 2\pi - \frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{12} + \pi + \frac{5\pi}{12} = 5\pi$$

۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴

