



۱) برای ماتریس‌های $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ، اگر $C = A \times B$ و $D = B \times C \times A$ باشد، $|D|$ کدام است؟

۴) صفر

۳) ۱

۲) ۲

۱) ۴

۲) اگر A و B دو ماتریس مربعی مرتبه ۲ و $AB = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل ضرب درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی ماتریس $B - \frac{3}{2}A$ کدام است؟

۴) -۹

۳) ۹

۲) -۳

۱) ۳

۳) اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & y \\ 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & z \end{bmatrix}$ و A^T ماتریس اسکار باشد، حاصل $x^2 - y + z$ کدام است؟

۴) صفر

۳) -۶

۲) -۲

۱) ۳

۴) اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 1 & x-1 \\ 1 & 1 & x \\ x & 1 & -1 \end{bmatrix}$ ، $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ و $D = ABC$ باشد، به ازای کدام مقدار x ، مجموع درایه‌های قطر اصلی و فرعی ماتریس D برابر هستند؟

۴) ۶

۳) ۵

۲) -۳

۱) -۴

۵) اگر $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & -5 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ و ماتریس X در رابطه ماتریسی $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{|A|} & 0 \\ 0 & -\sqrt{|A|} \end{bmatrix}$ صدق کند، کوچک‌ترین درایه ماتریس X کدام است؟

۴) ۵/۵

۳) ۵

۲) ۴/۵

۱) ۴

۶) اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، درایه‌های سطر اول ماتریس A^T کدام است؟

۴) [۹ ۵ -۷]

۳) [۱ ۰ -۲]

۲) [۹ ۱۲ ۱۶]

۱) [۱ -۱ ۰]

۷) ماتریس $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ ، α و β دو عدد حقیقی هستند که $\alpha A + \beta I = A^{-1}$ مقدار $\frac{\beta}{\alpha}$ کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) ۴ (۳) -۲ (۴) ۲

۸) اگر $A = \begin{bmatrix} x-1 & -x \\ 0 & 4 \\ y & z & z \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 2z & \frac{1}{2} & 2 \\ 2z & 0 & -4y \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ و ماتریس AB به ازای $y \in \mathbb{Z}$ ماتریس اسکالر باشد، مقدار xy کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) -۲ (۳) ۱ (۴) ۲

۹) فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ اگر $BA^T A = 53I$ باشد، ماکزیمم مقدار درایه‌های ماتریس B ، کدام است؟

- (۱) ۱۴ (۲) ۱۸ (۳) ۲۴ (۴) ۲۸

۱۰) فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ مجموع عناصر روی قطر اصلی ماتریس A ، کدام است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۱۷ (۳) ۱۹ (۴) ۲۱

۱۱) اگر ماتریس ناصفر $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ چنان باشد که $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 4 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4b_1 \\ 4b_2 \end{bmatrix}$ ، آنگاه مقدار a ، کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) صفر (۳) ۴ (۴) ۱۲

۱۲) از رابطه‌ی ماتریسی $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ ، ماتریس X ، کدام است؟

- (۱) $\begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ (۲) $\begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ (۳) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$ (۴) $\begin{bmatrix} -9 & -7 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

۱۳) فرض کنید $A = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ و ماتریس X ، جواب معادله‌ی $AX = A^{-1}$ باشد. ماتریس X ، کدام است؟

- (۱) $\begin{bmatrix} -32 & 14 \\ 48 & -25 \end{bmatrix}$ (۲) $\begin{bmatrix} 32 & -14 \\ -56 & 25 \end{bmatrix}$ (۳) $\begin{bmatrix} 16 & -7 \\ -28 & 21 \end{bmatrix}$ (۴) $\begin{bmatrix} 16 & -7 \\ -25 & 14 \end{bmatrix}$

۱۴) اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ باشد، درایه‌های سطر اول ماتریس A^3 ، کدام است؟

- (۱) $[30 \ 6 \ 64]$ (۲) $[30 \ 6 \ 78]$ (۳) $[24 \ 8 \ 86]$ (۴) $[30 \ 6 \ 86]$

۱۵ اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، درایه‌های سطر اول ماتریس A^4 ، کدام است؟

- (۱) $[0 \ 1 \ 0]$ (۲) $[1 \ 0 \ 0]$ (۳) $[0 \ 0 \ 1]$ (۴) $[1 \ 0 \ 1]$

۱۶ اگر $a + b + c = 5$ باشد، حاصل دترمینان $\begin{bmatrix} 4+a & b & c \\ a & 4+b & c \\ a & b & 4+c \end{bmatrix}$ ، کدام است؟

- (۱) ۱۲۰ (۲) ۱۲۴ (۳) ۱۳۵ (۴) ۱۴۴

۱۷ اگر دترمینان $D = \begin{vmatrix} 6 & 3x & 2x \\ 3x & 2x & 6 \\ 2x & 6 & 3x \end{vmatrix}$ باشد، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} x^2 & x^2 & 6 \\ 9 & 2x & 9 \\ 3x & 4 & 4 \end{vmatrix}$ ، کدام است؟

- (۱) $-2D$ (۲) $-D$ (۳) $\frac{1}{2}D$ (۴) D

۱۸ در دستگاه معادلات $\begin{cases} ax - 3y = 7 \\ bx + 4y = 2 \end{cases}$ اگر دترمینان ماتریس ضرایب برابر ۱۷ باشد، مقدار x کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) -۲

۱۹ اگر $A = \begin{bmatrix} 5+a & b & c \\ a & 5+b & c \\ a & b & 5+c \end{bmatrix}$ با شرط $a + b + c = 7$ ، دترمینان ماتریس $(5A^{-1})$ کدام است؟

- (۱) $\frac{5}{12}$ (۲) $\frac{5}{7}$ (۳) $\frac{25}{12}$ (۴) $\frac{25}{7}$

۲۰ اگر به هر درایه در سطر دوم دترمینان $\begin{vmatrix} 3 & 2 & a \\ 4 & -2 & 7 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix}$ یک واحد افزوده شود، به مقدار دترمینان ۶ واحد اضافه می‌شود.

a کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ابتدا ماتریس D را پیدا می‌کنیم. بنابر فرض سؤال می‌نویسیم:

$$D = B \times C \times A = B \times A \times B \times A = (BA)(BA) = (BA)^T \quad (۱)$$

اکنون ماتریس BA را به دست می‌آوریم.

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |BA| = 2$$

$$(۱) \Rightarrow |D| = |(BA)^T| = |BA| = 2^2 = 4 \quad \text{بنابراین:}$$

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از ماتریس A از چپ و از ماتریس B از راست فاکتور می‌گیریم.

$$A \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -6 & -1 \end{bmatrix} B - \frac{3}{2} A \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -4 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} B = A \left(\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -6 & -1 \end{bmatrix} - \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -4 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \right) B$$

$$= A \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} B = A(-3I)B = -3AB = -3 \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -6 \\ -\frac{3}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

بنابراین حاصلضرب درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی این ماتریس برابر ۹ است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & y \\ 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & y \\ 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+y & 0 & y+yz \\ 0 & x^2 & 0 \\ 1+z & 0 & y+yz^2 \end{bmatrix}$$

در ماتریس اسکالر، درایه‌های روی قطر اصلی برابرند و درایه‌های بالا و پایین قطر اصلی صفر هستند. پس:

$$\Rightarrow \begin{cases} 1+z=0 \Rightarrow z=-1 \\ x^2=1+y \Rightarrow x^2-y=1 \end{cases} \xrightarrow{+} x^2-y+z=0$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

$$D = ABC = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x-1 \\ 1 & 1 & x \\ x & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & x+1 & x-1 \\ x & -x+2 & x \\ -x-2 & -3 & -2x+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+5 & 0 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2x-7 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$x+2 = -x-6 \Rightarrow 2x = -8 \Rightarrow x = -4 \Rightarrow \text{مجموع درایه‌های قطر فرعی} = \text{مجموع درایه‌های قطر اصلی}$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حاصل دترمینان A را نسبت به ستون سوم به دست می‌آوریم.

$$|A| = -(-5)(-1+6) = 25$$

$$BXC = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{از طرف دیگر اگر } C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

درمی‌آید. بنابراین $X = B^{-1} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} C^{-1}$ داریم:

$$X = \frac{1}{-8+3} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \times \frac{1}{2-4} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \frac{5}{10} \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4/5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

۶

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ابتدا درایه‌های ماتریس A^2 را به دست آورید:

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

اکنون فقط درایه‌های سطر اول ماتریس A^2 را به دست می‌آوریم:

$$A^2 = A^2 \times A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

بنابراین درایه‌های سطر اول ماتریس A^3 به صورت $[1 \ -1 \ 0]$ است.

۷

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وارون ماتریس $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ برابر $A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}$ است. پس:

$$\alpha A + \beta I = A^{-1} \Rightarrow \alpha \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -\alpha + \beta & 2\alpha \\ 4\alpha & -3\alpha + \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

بنابراین:

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = \frac{3}{5} \Rightarrow -\frac{1}{5} + \beta = \frac{3}{5} \Rightarrow \beta = \frac{4}{5} \\ 4\alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{5}} = 4 \text{ در نتیجه}$$

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ابتدا ماتریس AB را پیدا می‌کنیم.

$$AB = \begin{bmatrix} x & -1 & -x \\ . & . & 4 \\ y & z & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2z & \frac{1}{y} & 2 \\ 2z & . & -4y \\ . & \frac{1}{y} & . \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2xz - 2z & . & 2x + 4y \\ . & 2 & . \\ 2yz + 2z^2 & \frac{y}{y} + \frac{z}{y} & 2y - 4yz \end{bmatrix}$$

ماتریس AB ماتریس اسکار است پس درایه‌های بالا و پایین قطر اصلی صفر و درایه‌های روی قطر اصلی همگی برابر یکدیگرند. بنابراین:

$$\begin{cases} 2xz - 2z = 2 \Rightarrow xz + z = 1 \xrightarrow{(1)(\frac{1}{z})} -xy + y = 1 \\ 2y - 4yz = 2 \Rightarrow y - 2yz = 1 \xrightarrow{(1)(\frac{1}{y})} y + 2y^2 = 1 \\ 2x + 4y = . \Rightarrow x = -2y \\ 2yz + 2z^2 = . \xrightarrow{z \neq 0} y = -z \quad (1) \\ \frac{y}{y} + \frac{z}{y} = . \Rightarrow y = -z \end{cases}$$

در نتیجه:

$$2y^2 + y - 1 = . \Rightarrow y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ غ ق ق}$$

$$-xy + y = 1 \xrightarrow{y=-1} -xy - 1 = 1 \Rightarrow xy = -2 \quad \text{بنابراین:}$$

دقت کنید $z \neq 0$ زیرا در غیر این صورت مقدار $2xz - 2z$ برابر صفر است و با اسکار بودن ماتریس AB در تناقض است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

نکته: ماتریس A^T (ترانواده ماتریس A)، ماتریسی است که از تعویض جای سطرها و ستون‌های ماتریس A حاصل می‌شود. (این تعریف در کتاب هندسه ۳ نظام جدید وجود ندارد.)

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$BA^T A = 52I \Rightarrow B \times \begin{bmatrix} 14 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 52I \Rightarrow B \times \frac{1}{52} \begin{bmatrix} 14 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = I$$

بنابراین ماتریس B، وارون ماتریس $\frac{1}{52} \begin{bmatrix} 14 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ است و در نتیجه داریم:

$$B = 52 \times \frac{1}{52} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -8 \\ -8 & 28 \end{bmatrix}$$

بنابراین ماکزیمم درایه‌های ماتریس B، برابر ۲۸ است.

تذکر: وارون ماتریس kA به صورت $\frac{1}{k}A^{-1}$ است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فقط درایه‌های قطر اصلی A را محاسبه می‌کنیم.

$$A = \begin{bmatrix} . & . & 1 \\ 1 & . & . \\ . & 1 & . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & 1 & . \\ 1 & . & . \\ . & . & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 7 & 8 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & 1 & . \\ 1 & . & . \\ . & . & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & ? & ? \\ ? & 7 & ? \\ ? & ? & 5 \end{bmatrix}$$

بنابراین مجموع درایه‌های قطر اصلی A برابر $9 + 7 + 5 = 21$ است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از تساوی ماتریسی داده شده یک دستگاه می‌سازیم و آن را حل می‌کنیم. ۱۱

$$\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 4 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4b_1 \\ 4b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 5b_1 - 2b_2 \\ 4b_1 + ab_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4b_1 \\ 4b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5b_1 - 2b_2 = 4b_1 \\ 4b_1 + ab_2 = 4b_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b_1 = 2b_2 \\ 4b_1 + ab_2 = 4b_2 \end{cases} \xrightarrow{b_1=2b_2} 8b_2 + ab_2 = 4b_2 \Rightarrow a = -4$$

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. با فرض $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ نتیجه می‌گیریم $B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ و با فرض $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$ نتیجه می‌گیریم $C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ ۱۲

حال طرفین رابطه‌ی ماتریسی داده شده را از چپ در B^{-1} و از راست در C^{-1} ضرب می‌کنیم.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow X = B^{-1} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} C^{-1}$$

$$\Rightarrow X = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 20 & -24 \\ -16 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. طرفین تساوی $AX = A^{-1}$ را از سمت چپ در A^{-1} ضرب می‌کنیم تا ماتریس X به دست آید. ۱۳

$$AX = A^{-1} \Rightarrow X = (A^{-1})^r (1)$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = -4 \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 8 & -3 \end{bmatrix}$$

$$(A^{-1})^r = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 8 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 8 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & -14 \\ -56 & 25 \end{bmatrix}$$

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ابتدا سطر اول ماتریس A^r و سپس سطر اول A^r را پیدا می‌کنیم. ۱۴

$$A^r = A \times A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 24 \\ U \\ U \end{bmatrix}$$

$$A^r = A^r \times A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 24 \\ U \\ U \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 6 & 86 \\ U \\ U \end{bmatrix}$$

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ابتدا ماتریس A^r را به دست می‌آوریم. ۱۵

$$A^r = A \times A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

حال فقط درایه‌های سطر اول A^r را پیدا می‌کنیم.

$$A^r = A^r \times A^r = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر ستون اول ماتریس را همزمان با دو ستون دیگر ماتریس جمع کنیم، آن‌گاه داریم:

$$\begin{vmatrix} a+b+c+4 & b & c \\ a+b+c+4 & b+4 & c \\ a+b+c+4 & b & c+4 \end{vmatrix} = (a+b+c+4) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & b+4 & c \\ 1 & b & c+4 \end{vmatrix}$$

حال اگر سطرهای دوم و سوم را منهای سطر اول کنیم، خواهیم داشت:



گزینه ۲ پاسخ صحیح است. روش اول:

$$\text{فرض: } \begin{vmatrix} 6 & 3x & 2x \\ 3x & 2x & 6x \\ 2x & 6 & 3x \end{vmatrix} = D \xrightarrow[x=1]{\text{عددگذاری}} \begin{vmatrix} + & - & + \\ 6 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 6(-30) - 3(-3) + 2(14) = 180 + 9 + 28 = -143$$

$$\text{کم: } \begin{vmatrix} x^2 & x^2 & 6 \\ 9 & 2x & 9 \\ 3x & 4 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow[x=1]{\text{عددگذاری}} \begin{vmatrix} + & - & + \\ 1 & 1 & 6 \\ 9 & 2 & 9 \\ 3 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times (-28) - 1 \times (-9) + 6 \times (30) = -28 - 9 + 180 = +143$$

روش دوم: با انتخاب $x = 0$ نتیجه می‌گیریم.

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & 0 \end{vmatrix} = D \Rightarrow 6(-6^2) = D \Rightarrow D = -6^3$$

حالا مقدار دترمینان خواسته شده را به‌ازای $x = 0$ به‌دست می‌آوریم.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 9 & 0 & 9 \\ 0 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 6(36) = 6^3$$

بنابراین این دترمینان برابر $-D$ می‌باشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

در دستگاه معادلات $\begin{cases} ax - 3y = 7 \\ bx + 4y = 2 \end{cases}$ اگر دترمینان ماتریس ضرایب ۱۷ باشد، مقدار x از روش کرامر برابر است با:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & -3 \\ b & 4 \end{vmatrix}} = \frac{7 \times 4 - 2 \times (-3)}{\text{دترمینان ماتریس ضرایب}} = \frac{28 + 6}{17} = 2$$

توجه: یادآوری می‌شود که طبق دستور کرامر داریم:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}}, y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}}$$

گزینه‌ی ۱ پاسخ صحیح است. ستون دوم و سوم را به ستون اول اضافه کرده و از $b + c + 5$ فاکتور می‌گیریم:

$$|A| = \begin{vmatrix} a+b+c+5 & b & c \\ a+b+c+5 & b+5 & c \\ a+b+c+5 & b & c+5 \end{vmatrix} = (a+b+c+5) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & b+5 & c \\ 1 & b & c+5 \end{vmatrix}$$

قرینه‌ی سطر اول را به دو سطر بعدی اضافه می‌کنیم.

$$|A| = 12 \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 12 \times 5^2$$

$$(|5A^{-1}|) = 5^3 |A^{-1}| = 5^3 \frac{1}{|A|} = \frac{5^3}{12 \times 5^2} = \frac{5}{12}$$

گزینه‌ی ۳ پاسخ صحیح است.

$$\left. \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 3 & 2 & a \\ 4 & -2 & 7 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 20a - 189 \\ \begin{vmatrix} 3 & 2 & a \\ 5 & -1 & 8 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 25a - 198 \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{فرض سوال}]{\text{باتوجه به}} (20a - 189) + 6 = 25a - 198 \Rightarrow 5a = 15 \Rightarrow a = 3$$

روش دوم:

$$\text{می‌دانیم} \begin{vmatrix} a+a' & b+b' & c+c' \\ x & y & z \\ m & n & p \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ m & n & p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' & c' \\ x & y & z \\ m & n & p \end{vmatrix}$$



$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & a \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 6 \xrightarrow{\text{سطر سوم}} 0 - 5 \times (3 - a) + 6(3 - 2) = 6 \rightarrow 0 - 5 \times (3 - a) = 0 \Rightarrow a = 3$$

۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴

