

فصل 1 – دنیای زنده

پروانه‌های موناک یکی از شگفت‌انگیزترین مهاجرت‌ها را به نمایش می‌گذارند. جمعیت این پروانه‌ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید. چگونه پروانه‌های موناک مسیر خود را پیدا می‌کنند و راه را به اشتباه نمی‌روند؟ زیست‌شناسان پس از سال‌ها پژوهش، به‌تازگی این معما را حل کرده‌اند. آنان در بدن پروانه موناک، یاخته‌های عصبی (نورون‌هایی) یافته‌اند که پروانه‌ها با استفاده از آنها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می‌دهند و به‌سوی آن پرواز می‌کنند.

آیا علم زیست‌شناسی قادر است همه رازهای حیات را بیابد؟ زیست‌شناسان علاوه بر تلاش برای پی‌بردن به رازهای آفرینش، سعی می‌کنند یافته‌های خود را در بهبود زندگی انسان به کار برند. موجودات زنده چه ویژگی‌هایی دارند که آنها را از موجودات غیرزنده متمایز می‌کند. در این فصل به پاسخ چنین پرسش‌هایی می‌پردازیم.

محدوده علم زیست‌شناسی

امروزه بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قند و افزایش فشارخون که حدود صد سال پیش به مرگ منجر می‌شدند، مهار شده‌اند و به علت روش‌های درمانی و داروهای جدید، دیگر مرگ‌آور نیستند. ممکن است با مشاهده پیشرفت‌ها و آثار علم زیست‌شناسی، این تصور در ذهن ما شکل بگیرد که این علم به اندازه‌ای توانا و گسترده است که می‌تواند به همه پرسش‌های انسان پاسخ دهد و همه مشکلات زندگی ما را حل کند؛ درحالی‌که این‌طور نیست. به‌طور کلی علم تجربی، محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند به همه پرسش‌های ما پاسخ دهد و از حل برخی مسائل بشری ناتوان است. فرایندهایی را بررسی می‌کنیم که برای ما به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری اند.

موناک	
یوکاریوت – جانور – بی مهره – بندپا – حشره	رده بندی
لوله گوارشی	گوارش
تنفس نایبسی مستقل از دستگاه گردش مواد	تبادلات گازی
سامانه گردش باز	گردش مواد
لوله های مالپیگی متصل به روده	دفع
مرکزی: مغز (چند گره به هم جوش خورده) و طناب عصبی شکمی گره دار محیطی: اعصاب جانبی	دستگاه عصبی
چشم مرکب	گیرنده های حسی ویژه
اسکلت بیرونی	اسکلت و حرکت
فقط دفاع غیر اختصاصی	ایمنی
لقاح داخلی و تخم گذار	تولید مثل

1- کدام گزینه در مورد جانوری که هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید، درست نیست؟

- 1) برخلاف ماهی، مایعی که وارد قلب میشود، حاوی CO_2 نیست.
- 2) همانند کیوتر، انتقال مواد غذایی توسط گردش مواد انجام میشود
- 3) همانند ملخ، دستگاه گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد
- 4) برخلاف کوسه ماهی فاقد یاخته های استخوانی در بدن خود می باشد

زیست شناسی نوین

امروزه زیست شناسی ویژگی هایی دارد که آن را به رشته ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده است. در ادامه به این ویژگی ها می پردازیم.

کل نگری: جوهرچینی (پازلی) را در نظر بگیرید که از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده است. ممکن است هر یک از قطعات آن به تنهایی بی معنی به نظر آید؛ اما اگر قطعه های آن را یکی یکی در جای درست در کنار همدیگر قرار دهیم، مشاهده می کنیم که اجزای جوهرچین، به تدریج نمایی بزرگ، کلی و معنی دار پیدا می کنند و تصویری از شیئی آشنا به ما نشان می دهند.

بیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این اجزا، بخشی از یک سامانه بزرگ را تشکیل می دهد که در تمامی کلی برای ما معنی پیدا می کند. بنابراین، جانداران را نوعی سامانه می دانند که اجزای آن باهم ارتباط دارند؛ به همین علت ویژگی های سامانه را نمی توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزای نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و کلی سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.

نگرش بین رشته ای: زیست شناسان امروزی برای شناخت هر چه بیشتر سامانه های زنده از اطلاعات رشته های دیگر نیز کمک می گیرند؛ مثلاً برای بررسی زن های جانداران، علاوه بر اطلاعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشته های دیگر هم استفاده می کنند.

فناوری های نوین: این فناوری ها نقش مهمی در پیشرفت علم زیست شناسی داشته و دارند. در ادامه به نمونه هایی از این فناوری ها می پردازیم.

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی: امروزه بیشتر از هر زمان دیگر به جمع آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز داریم؛ دستاوردها و تحولات بیست ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت زیست شناسی، تأثیر بسیاری داشته است. این فناوری ها امکان انجام محاسبات را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کرده اند (شکل ۱).

مهندسی ژنتیک: مدت‌هاست که زیست‌شناسان می‌توانند با استفاده از مهندسی ژنتیک در جانداران تغییر ایجاد کنند. مهندسی ژنتیک مجموعه‌ای از روش‌ها و فنون آزمایشگاهی است که به منظور تغییر در محتوای دنا جانداران و ایجاد صفت جدید به کار می‌رود. انتظار نداریم که جانوری مانند بز بتواند پروتئین تار عنکبوت بسازد، اما این کار با استفاده از مهندسی ژنتیک رخ داده است. پژوهشگران توانسته‌اند با انتقال ژن، بزهایی تولید کنند که در شیر آنها این پروتئین ساخته می‌شود که در صورت تجاری شدن تحولی در صنعت رخ خواهد داد. تار عنکبوت از مواد ارزشمند در طبیعت است و می‌تواند کاربردهای وسیعی در صنایع متفاوت داشته باشد.

اخلاق زیستی: پیشرفت‌های سریع علم زیست‌شناسی، به‌ویژه در مهندسی ژنتیک، زمینه سوءاستفاده‌هایی را در جامعه فراهم کرده است. محرمانه بودن اطلاعات ژنی و نیز اطلاعات پزشکی افراد و حقوق جانوران از موضوع‌های اخلاق زیستی هستند.

یکی از سوءاستفاده‌ها از علم زیست‌شناسی، تولید سلاح‌های زیستی است. چنین سلاحی مثلاً می‌تواند عامل بیماری‌زایی باشد که نسبت به داروهای رایج مقاوم است یا فرآورده‌های غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد باشند. بنابراین وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی از علم زیست‌شناسی ضروری است.

زیست‌شناسی در خدمت انسان

امروزه با مسائل فراوانی در زمینه‌های متفاوت مواجه هستیم. زیست‌شناسی به حل این مسائل چه کمکی می‌تواند بکند؟ در ادامه مروری بر نقش زیست‌شناسی در حل این مسائل داریم.

تأمین غذای سالم و کافی: گفته می‌شود که هم‌اکنون حدود یک میلیارد نفر در جهان از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می‌برند؛ چگونه غذای سالم و کافی برای جمعیت‌های رو به افزایش انسانی فراهم کنیم؟

می‌دانیم غذای انسان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می‌آید؛ پس شناخت بیشتر گیاهان یکی از راه‌های تأمین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر است. از راه‌های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است. گیاهان مانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، حشرات و مانند آنها رشد می‌کنند و محصول می‌دهند. بنابراین، شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیانمند بین این عوامل و گیاهان، به افزایش محصول کمک می‌کند.

حفاظت از بوم‌سازگان‌ها، ترمیم و بازسازی آنها: انسان، جزئی از دنیای زنده است و لذا نمی‌تواند بی‌نیاز و جدا از موجودات زنده دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد. به‌طورکلی منابع و سودهایی را که هر بوم‌سازگان دربردارد، خدمات بوم‌سازگان می‌نامند. میزان خدمات هر بوم‌سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. پایدار کردن بوم‌سازگان‌ها به‌طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آنها روی ندهد، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود.

تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر: نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است. بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی، مانند نفت، گاز و بنزین تأمین می‌شود؛ اما می‌دانیم که سوخت‌های فسیلی موجب افزایش کربن دی‌اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت باعث گرمایش زمین می‌شوند. بدین لحاظ، انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و پاک‌تر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. زیست‌شناسان می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت‌های زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید، کمک کنند.

2- در ارتباط با سامانه پیکری هریک از جانداران، کدام گزینه به طور حتم صحیح است ؟

- (1) اجزای آن، دارای ارتباط بوده و این ارتباط به تنهایی در توصیف سامانه موثر است
- (2) از اجزای متعددی تشکیل شده است که در نمای کلی برای ما معنا پیدا میکنند
- (3) ویژگی آن را تنها از طریق مطالعه اجزای سازنده آن میتوان توضیح داد
- (4) کل نگری باعث میشود تا کل سامانه کمتر از مجموع اجزای آن باشد

3- کدام عبارت زیر درست بیان شده است ؟

- (1) گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، باعث کاهش اندازه، ظرفیت و قیمت حافظه های امروزی شده است
- (2) انتقال ژن ها طی فرایند های مربوط به مهندسی ژنتیک، به گونه ای است که ژن ها نمی توانند اثر خود را ظاهر کنند
- (3) فرایند های مربوط به مهندسی ژنتیک، منجر به انتقال ژن ها از یاخته های یک جاندار به سایر یاخته های آن میشود
- (4) پیشرفت های سریع در مهندسی ژنتیک زمینه سو استفاده را فراهم آورده و از موضوع های اخلاق زیستی به شمار میرود

4 - کدام گزاره در مورد اخلاق زیستی از نظر درستی یا نادرستی نسبت به سایر گزینه ها متفاوت است؟

- (1) هر سلاح زیستی موجب ایجاد عواقب زیان بار در زمینه علم مهندسی ژنتیک میشود
- (2) هر عامل بیماری زا با توانایی ورود به پیکر جانداران، جز سلاح های زیستی محسوب میشود
- (3) همه قوانین وضع شده به منظور جلوگیری از سو استفاده در این زمینه مربوط به داروها است
- (4) همه اطلاعات ژنی موجود در ماده وراثتی جانداران به عنوان نوعی اخلاق زیستی محرمانه باقی می ماند

5 - چه تعداد از موارد زیر به نادرستی مطرح شده است ؟

- (1) چندین اجتماع در دریاچه ارومیه زندگی می کنند
 - (2) محیط خارجی جانداران همانند محیط داخلی ان ها همواره در حال تغییر است
 - (3) پایدار کردن بوم سازگان با افزایش چشمگیر در میزان تولیدکنندگی ان روی میدهد
 - (4) همه جانداران طی هم ایستایی توانایی ثابت نگه داشتن وضعیت درونی یاخته های خود را دارند
- (1) (2) (3) (4)

6 - در روشی از پزشکی که پزشکان روش های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی میکنند.....

1. تنها تشخیص بیماری های مربوط به ژن ها امکان پذیر است
2. امکان پیش بینی یک بیماری قبل از بروز علائم آن وجود دارد
3. روش درمانی با توجه به وضعیت جسمانی بیماری تعیین میشود
4. بررسی ژن های هر فرد تنها برای پیشگیری از بیماری صورت میگیرد



7 - کدام گزینه با توجه به شکل مقابل نادرست است ؟

- 1) میتواند زیستگاه جاندارانی غیر هم گونه باشد
- 2) تهیه این تصویر به طور حتم حاصل نگرش بین رشته ای می باشد
- 3) منابع و سود های بوم سازگان مقابل ، خدمات آن نامیده شده که به میزان گیاهان آن بستگی دارد
- 4) سطحی از حیات میباشد که ارتقای کیفیت زندگی انسان ها وابسته به افزایش خدمات و افزایش تغییرات تولیدکنندگی آن میباشد

گفتار ۲ گستره حیات

تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیرممکن باشد. در علم زیست شناسی به جای تعریف حیات، ویژگی های آن و یا ویژگی های جانداران را بررسی می کنیم. گستره حیات زمینی از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد.

جانداران همه این هفت ویژگی زیر را باهم دارند:

نظم و ترتیب: یکی از ویژگی های جالب حیات، سطوح سازمان یابی آن است (شکل ۳). همه جانداران، سطحی از سازمان یابی دارند و منظم اند.

هم ایستایی (هومئوستازی): محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه دارد؛ مثلاً وقتی سدیم خون افزایش می یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود. مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می شود هم ایستایی (هومئوستازی) می نامند.

رشد و نمو: جانداران رشد و نمو می کنند. رشد به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته هاست. نمو به معنی عبور از مرحله ای به مرحله دیگری از زندگی است؛ مثلاً تشکیل گل در گیاه، نمونه ای از نمو است.

فرایند جذب و استفاده از انرژی: جانداران انرژی می گیرند؛ از آن برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می دهند؛ مثلاً گنجشک غذا می خورد و از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جست و جوی غذا استفاده می کند.

تولید مثل: جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می شود.

پاسخ به محیط: همه جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند؛ مثلاً ساقه گیاهان به سمت نور خم می شود.

سازش با محیط: این ویژگی باعث می شود جمعیتی از جانداران با محیطی که در آن زندگی می کنند، متناسب و در آن ماندگار باشند؛ مثلاً گیاهانی که بومی مناطق خشک هستند، برای حفظ آب برگ هایی با پوست ضخیم دارند مثال دیگر موهای سفید خرس قطبی است که به استار این جانور در محیط یرفی کمک می کند.

سطوح مختلف حیات

یکی از ویژگی های جالب حیات سطوح سازمان یابی آن است. گستره حیات، از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد.

سطوح سازمان یابی حیات:

- ۱) یاخته پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است. همه جانداران از یاخته تشکیل شده اند.
- ۲) تعدادی یاخته یک بافت را به وجود می آورند.
- ۳) هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوان.
- ۴) هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثلاً دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان ها تشکیل شده است.
- ۵) جاندارانی مانند این گوزن، فردی از جمعیت گوزن هاست.
- ۶) افراد یک گونه که در زمان و مکانی خاص زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.
- ۷) جمعیت های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می آورند.
- ۸) عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند، بوم سازگان را می سازند.
- ۹) زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه اند.
- ۱۰) زیست کره شامل همه زیست بوم های زمین است.

گونه: همان طور که می دانید گونه به گروهی از جانداران می گویند که به هم شبیه اند و می توانند از طریق تولید مثل زاده هایی شبیه خود را قابلیت زنده ماندن (زیست) و تولید مثل (زایا) به وجود آورند.



8- کدام گزینه عبارت زیر نادرست است؟

<< در جانداران زنده.....نمونه ای از محسوب میشود.>>

- 1) افزایش دفع سدیم در پی افزایش غلظت آن در خون انسان-هم ایستایی
- 2) گرم شدن بدن در پی مصرف غذا - جذب و استفاده از انرژی
- 3) افزایش اندازه یاخته های گیاهی در پی جذب آب-رشد
- 4) تقسیم یاخته های پروکاریوتی - تولید مثل

9- ویژگی مشترک همه افرادی که به یک گونه تعلق داشته و در یک زمان و مکان خاص زندگی میکنند، در کدام گزینه به درستی عنوان شده است؟

- 1) از تمام انرژی موجود در مواد غذایی، برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده میکنند
- 2) تعدادی از یاخته های آن ها با یکدیگر همکاری کرده و یک بافت را تشکیل میدهند
- 3) به واسطه تقسیم یاخته ای موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می آورند
- 4) مجموعه اعمالی را برای پایدار نگه داشتن برای وضعیت درونی خود انجام می دهند

10- کدام گزینه در رابطه با سطوح سازمان یابی زیستی به نحوه متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها مطرح شده است؟

- 1) پایین ترین سطح سازمان یابی زیستی در همه جانداران، اطلاعات وراثتی خود را درون غشاهایی مجزا حفظ میکند
- 2) در سطح تشکیل شده از بوم سازگان های دارای آب هوایی متفاوت، ویژگی سازش با محیط دیده نمی شود
- 3) کوچک ترین سطح حاصل از اجتماع جانداران، در پی نخستین ارتباط بین گونه های متفاوت ایجاد میشود
- 4) بالاترین سطح سازمان یابی زیستی، همه جانداران موجود در کره زمین را در برمی گیرد

11- در سطوح سازمان یابی حیات.....سطح.....برخلاف.....قابل انتظار است.

- 1) چهارمین - وجود چند نوع بافت مختلف - وجود چند نوع اندام
- 2) هشتمین - وجود چند اجتماع زیستی - تعامل بین گونه های مختلف
- 3) نهمین - جانداران و اقلیم های متفاوت - اثر گذاشتن عوامل زنده و غیر زنده باهم
- 4) ششمین - مشاهده افراد موجود در یک زمان و یک مکان - تعامل بین اجزای زنده و غیر زنده

12- به طور معمول و با توجه به سطوح سازمان یابی حیات ، چند مورد به طور صحیح بیان نشده است ؟

- 1) بزرگ ترین سطح حاصل از اجتماع مولکول ها، شامل همه بخش های کره زمین بوده و در انتهای گسترده حیات قرار دارد
- 2) هر بوم سازگانی که در سطح نهم سازمان یابی در یک دسته قرار میگیرد ، از نظر اقلیم و پراکندگی جانداران شبیه است
- 3) در بالاترین سطحی که تنها شامل اجزای زنده است ، افراد متعلق به جمعیت های چند اجتماع قابل مشاهده هستند
- 4) سطحی که تنها شامل افراد یک گونه است ، به طور حتم همه اجزای آن ،همه هفت ویژگی را حیات را باهم دارند
- 5) بزرگ ترین سطحی که در تشکیل اندام ها نقش دارد ، تنها از یک نوع یاخته با ظاهر مشابه تشکیل شده است

2(4 مورد

3(3 مورد

2(4 مورد

1(5 مورد

مولکول های زیستی

کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها چهار گروه اصلی مولکول های تشکیل دهنده یاخته اند و در جانداران ساخته می شوند. این مولکول ها را مولکول های زیستی می نامند. در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

کربوهیدرات ها

این مولکول ها از سه عنصر کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن (O) ساخته شده اند
مونوساکاریدها ساده ترین کربوهیدرات ها هستند. گلوکز و فروکتوز مونوساکاریدهایی با شش کربن اند. ریبوز مونوساکاریدی با پنج کربن است (شکل ۴).



دی ساکاریدها از ترکیب دو مونوساکارید تشکیل می شوند. شکر و قندی که می خوریم، دی ساکاریدی به نام ساکارز هستند. ساکارز از پیوند بین گلوکز و فروکتوز تشکیل می شود. مالتوز دی ساکارید دیگری است که از دو گلوکز تشکیل می شود. این قند در جوانه گندم و جو وجود دارد (شکل ۵). لاکتوز دی ساکارید دیگری است که به قند شیر نیز معروف است.

پلی ساکاریدها از ترکیب چندین مونوساکارید ساخته می شوند. نشاسته، سلولز و گلیکوژن پلی ساکاریدند. این پلی ساکاریدها از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده اند؛ مثلاً نشاسته در سیب زمینی و غلات وجود دارد آیا روش تشخیص نشاسته را به یاد می آورید؟
 سلولز از پلی ساکاریدهای مهم در طبیعت است. سلولز ساخته شده در گیاهان در کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه ها به کار می رود.

مونوساکاریدها <i>ساده ترین</i>	پنج کربنی	ریبولوز - ریبوز - دئوکسی ریبوز
	شش کربنی	گلوکز - گالاکتوز - فروکتوز
دی ساکاریدها <i>۲ کربنی</i>	ساکارز	شکر و قند : گلوکز + فروکتوز
	لاکتوز	قند شیر: گلوکز + گالاکتوز
	مالتوز	قند جوانه گندم و جو: گلوکز + گلوکز
پلی ساکاریدها <i>پلی مری از گلوکز</i>	جانوری	ذخیره ای: گلیکوژن (در کبد و ماهیچه جانوران و در قارچ ها)
		ساختاری: کیتین
	گیاهی	ذخیره ای: نشاسته (مثلاً در سیب زمینی و غلات) ساختاری: پکتین - سلولز (کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه ها)

کربوهیدرات ها
C-H-O

گلیکوژن در جانوران و قارچ‌ها ساخته می‌شود. این پلی ساکارید در کبد و ماهیچه وجود دارد و منبع ذخیره گلوکز در جانوران است.


لیپیدها

این ترکیبات نیز از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده‌اند؛ گرچه نسبت این عناصر در لیپیدها با نسبت آنها در کربوهیدرات‌ها فرق می‌کند. در ادامه با برخی لیپیدها آشنا می‌شویم.

تری گلیسریدها از انواع لیپیدها هستند. هر تری گلیسرید از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است (شکل ۶-الف)، روغن‌ها و چربی‌ها انواعی از تری گلیسریدها هستند. تری گلیسریدها در ذخیره انرژی نقش مهمی دارند. انرژی تولید شده از یک گرم تری گلیسرید حدود دو برابر انرژی تولید شده از یک گرم کربوهیدرات است.

فسفولیپیدها گروه دیگری از لیپیدها و بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته‌ای هستند. ساختار فسفولیپیدها شبیه تری گلیسریدها است، با این تفاوت که مولکول گلیسرول در فسفولیپیدها به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل می‌شود (شکل ۶-ب).

کلسترول لیپید دیگری است که در ساخت غشای یاخته‌های جانوری و نیز انواعی از هورمون‌ها شرکت می‌کند.



تری گلیسریدها	یک گلیسرول + سه اسیدچرب - فراوانترین لیپید غذا - روغن و چربی انرژی حدود دو برابر کربوهیدرات‌ها
فسفولیپیدها	سر آب دوست: یک گلیسرول و فسفات + دم آبگریز: دو اسیدچرب جز اصلی غشا - در صفرا
کلسترولها	اسکلت چهار حلقه ای - صفرا - بعضی از هورمون‌ها - غشای سلول جانوری در لیپوپروتئین‌های HDL و LDL
سوبرین و کوتین	دیواره سلول‌های گیاهی

پروتئین‌ها

این مولکول‌ها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن (N) نیز دارند. پروتئین‌ها از به هم پیوستن واحدهایی به نام آمینواسید، تشکیل می‌شوند (شکل ۷).



پروتئین‌ها کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. انقباض ماهیچه، انتقال مواد در خون و کمک به عبور مواد از غشای یاخته و عملکرد آنزیمی از کارهای پروتئین‌هاست. آنزیم‌ها مولکول‌های پروتئینی‌اند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند.

نوکلئیک اسیدها

این مولکول‌ها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و فسفر نیز دارند. مولکول دنا (DNA) که در سال‌های قبل با آن آشنا شده‌اید، یک نوع نوکلئیک اسید است. اطلاعات وراثتی در دنا ذخیره می‌شود (شکل ۸).



شکل ۸-دنا

کلاژن - الاستین	ساختاری	پروتئین ها C-H-O-N
گلو تن - آلبومین	ذخیره ای	
هموگلوبین - میوگلوبین - عامل داخلی معده - کانال ها - پمپ ها	انتقال دهنده	
بسیاری از هورمون ها - ناقل های عصبی - مهارکننده - فعال کننده - عوامل رونویسی	تنظیمی	
گیرنده هورمون - گیرنده ناقل عصبی - گیرنده آنتی ژنی	گیرنده	
اکتین - میوزین	حرکتی	
پادتن - پرفورین - پروتئین مکمل - اینترفرون	دفاعی	
درون یاخته ای: هلیکاز - رنابسپاراز - دنابسپاراز - روبیسکو - انیدراز کربنیک - سر میوزین - آنزیم های لیزوزومی برون یاخته ای: پروترومبیناز - پپسین - آمیلاز - لیزوزیم غشایی: پمپ سدیم پتاسیم	آنزیمی	

چهار گروه اصلی مولکول های زیستی		
نوع مولکول زیستی	عناصر به کار رفته در آنها	توضیح
(۱) کربوهیدرات ها	کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن (O)	به آنها ساکاریدها یا قندها گفته می شود
(۲) لیپیدها	کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن (O) در فسفولیپیدها عنصر P نیز به کار رفته است	چیزی که بچه ها همیشه اشتباه می کنند اینه که فکر می کنند چربی ها همان لیپیدها هستند، در حالی که این گونه نیست! چربی ها زیر مجموعه ای از لیپیدها هستند.
(۳) پروتئین ها	کربن (C)، هیدروژن (H)، اکسیژن (O) و نیتروژن (N)	وقتی که پلی پپتیدها پیچ و تاب فضایی می خورند به پروتئین تبدیل می شوند.
(۴) اسیدهای نوکلئیک	کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن (O)، نیتروژن (N) و فسفر (P)	نوکلئوس به معنای هسته است و اسیدهای نوکلئیک همان اسیدهای هسته ای هستند (البته این به این معنی نیست که همیشه درون هسته قرار گرفته باشند)

نکات موثو ساکارید ها:

۱. ریبوز در کربن شماره ۲ پریم خود یک اکسیژن نسبت به دئوکسی ریبوز بیشتر دارد. بنابراین وزن مولکولی ریبوز نسبت به دئوکسی ریبوز بیشتر است.
۲. باید توجه داشت که قند معمول به کار رفته در واکنش تنفس یاخته ای گلوکز است. اما همواره از قند گلوکز در این فرایند استفاده نمی شود. مثلاً در زیست یازدهم میخوانیم که غده وزیکول سمینال مایع غنی از فروکتوز ترشح می کند که از این قند برای تامین انرژی لازم برای فعالیت اسپرم استفاده می شود.

نکات دی ساکارید ها:

۱. هر مولکول زیستی که در جوانه جو به کار می رود منجر به بیماری سلپاک نمی شود.
۲. هر عاملی که باعث تولید شیر شود، در تولید لاکتوز نقش دارد. هورمون پرولاکتین یکی از هورمون های ترشح شده از هیپوفیز پیشین است که باعث تولید شیر در غدد برون پستان می شود «» پس میتوان گفت پرولاکتین در تولید لاکتوز نقش دارد.
۳. در باکتری اشترشیا کلای (اکلای) قند ترجیحی گلوکز است. اما در شرایط نبود گلوکز میتواند از لاکتوز و مالتوز نیز استفاده کند.

نکات پلی ساکارید ها:

۱. عواملی که در تولید پارچه نقش دارند:
 - a. **مولکولی** که در تولید پارچه نقش دارد «» سلولز
 - b. **یاخته ای** از آن برای تولید پارچه استفاده می شود «» یاخته فیبر (گروهی از یاخته های بافت اسکلرانشیمی در گیاهان)
۲. از معرف **لوگول** برای شناسایی نشاسته استفاده می شود. وقتی لوگول در مجاورت نشاسته قرار بگیرد از رنگ قهوه ای روشن به آبی تغییر رنگ می دهد.
۳. گلیکوژن در کبد با کمک هورمون **انسولین** تولید می شود و با کمک هورمون **گلوکاگون** تجزیه می شود
۴. برخی ترکیبات پلی ساکاریدی می توانند با ذخیره شدن در واکوئول های یاخته های گیاهی موجب جذب و ذخیره آب در آن ها شوند. گیاه در دوره های کم آبی از این آب استفاده می کند.

نکات لیپید ها

الف) تری گلیسرید:



۱. تری گلیسریدها فروانترین لیپیدها رژیم غذایی هستند.
۲. در ساختار آن ها هم بخش آبدوست مشاهده می شود (موکول گلیسرول) و هم بخش آب گریز (سه اسید چرب)
۳. حجم زیاد از یاخته های تشکیل دهنده بافت پیوندی چربی از تری گلیسرید تشکیل شده است. به طوری باعث شده است یاخته های بافت چربی هسته ی حاشیه ای داشته باشند.

ب) فسفولیپید ها

۱. فسفولیپید ها علاوه بر شرکت در غشای یاخته، به عنوان یکی از ترکیبات صفرا به کار می روند.
۲. در بین لیپیدها تنها لیپیدی است که در آن یک **گروه فسفات** به کار رفته است (مانند نوکلئیک اسیدها)

ج) کلسترول


۱. کلسترول لیپیدی است که در بخش های زیر به کار رفته است:
 - ۱) در غشای یاخته های جانوری «» فقط در یک لایه فسفولیپیدی مشاهده می شود.
 - ۲) در ترکیب هورمون ها «» هورمون هایی مانند هورمون های جنسی (استروژن، پروژسترون و تستوسترون) به کار رفته است



یاخته و بافت در بدن انسان

گفتار ۳

یاخته، واحد ساختار و عملکرد در جانداران است. در شکل ۹ بخش‌های تشکیل دهنده یک یاخته جانوری را می‌بینید. هریک از بخش‌های یاخته چه کاری انجام می‌دهند؟ می‌توان به سادگی که این یاخته از سه بخش هسته، سیتوپلاسم و غشا تشکیل شده است.



شکل یاخته جانوری و اندامک‌های آن:

رئتن (ریبوزوم): کار آن ساختن پروتئین است.

شبكة آندوپلاسمی: شبکه‌ای از لوله‌ها و کیسه‌ها که در سراسر سیتوپلاسم گسترش دارند و بر دو نوع زبر (دارای رئتن) و صاف (بدون رئتن) است. شبکه آندوپلاسمی زبر در ساختن پروتئین‌ها و شبکه آندوپلاسمی صاف در ساختن لیپیدها نقش دارد.

دستگاه گلژی: از کیسه‌هایی تشکیل شده است که روی هم قرار می‌گیرند. در بسته بندی مواد و ترشح آنها به خارج از یاخته نقش دارد.

راکیزه (میتوکندری): دو غشا دارد و کار آن تأمین انرژی برای یاخته است.

کافنده تن (لیوزوم): کیسه‌ای است که انواعی از آنزیم‌ها برای تجزیه مواد دارد.

میانک (سانتریول): از یک جفت استوانه عمود بر هم تشکیل شده است و در تقسیم یاخته ای نقش دارد.

ریز کیسه (وزیکول): کیسه‌ای است که در جابه جایی مواد در یاخته نقش دارد.

هسته

هسته شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص و فعالیت های آن را کنترل می کند. در هسته، دنا قرار دارد. دنا دارای اطلاعات لازم برای تعیین صفات است. هسته پوششی دو لایه (غشای داخلی، غشای بیرونی) دارد. در این پوشش منافذی وجود دارند که از طریق آنها ارتباط بین هسته و سیتوپلاسم برقرار می شود. ساختار کروی شکلی در هسته دیده می شود که هستک نام دارد. هستک در ساختن رناتن نقش دارد.


سیتوپلاسم

سیتوپلاسم فاصله بین غشای یاخته و هسته را پر می کند. سیتوپلاسم از اندامک ها و ماده زمینه تشکیل شده است. ماده زمینه شامل آب و مواد دیگر است. هر یک از اندامک ها در سیتوپلاسم کار ویژه ای دارند (شکل ۹). در سال های بعد با بعضی از این اندامک ها بیشتر آشنا می شوید.

انواع یاخته ها (ساختارها) بر اساس تعداد هسته		
تعداد		مثال
فاقد هسته	زنده	گلبول قرمز بالغ (خون) در انسان و بسیاری پستانداران
		یاخته های آوند آبکش گیاهان
	مرده	مانند آوند چوب گیاهان
تک هسته ای		اغلب یاخته ها
دو هسته ای		بعضی از یاخته های قلبی
		یاخته دو هسته ای در کیسه رویانی
چند هسته ای		ماهیچه مخطط اسکلتی
		اندوسپرم مایع (شیره نارگیل)

غشای یاخته ای


اطراف یاخته را غشای یاخته ای احاطه کرده است. این غشا مرز بین درون یاخته و بیرون آن است. مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از این غشا عبور کنند. غشای یاخته، نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد؛ یعنی فقط برخی از مواد می توانند از آن عبور کنند. غشای یاخته از دو لایه مولکول های فسفولیپید تشکیل شده است که در آن مولکول های پروتئین و کلسترول قرار دارند. همچنین انواعی از کربوهیدرات ها به مولکول های فسفولیپیدی و پروتئینی متصل اند (شکل ۱۰). این ترکیبات را به ترتیب گلیکولیپید و گلیکوپروتئین نامیده اند.



شکل ۱۰- غشای یاخته


نکات مربوط غشا:

۱. کلاسترول که فقط در سلول های جانوری مشاهده می شود هر کلاسترول فقط در یک نیم لایه فسفولیپیدی غشا به کار می رود.
۲. کربوهیدرات ها فقط در نیم لایه بیرونی غشا قرار دارند و می توانند هم به پروتئین متصل شوند (گلیکوپروتئین) و هم به فسفولیپیدها (گلیکولیپید)
۳. پروتئین های سطحی درونی نمی توانند با هیچ گونه کربوهیدراتی در ارتباط باشند.
۴. پروتئین های سراسری هم می توانند با قسمت آب دوست فسفولیپیدها و هم با قسمت آب گریز آنها ارتباط داشته باشند.
۵. با در نظر گرفتن فرایند های اندوسیتوز و اگزوسیتوز میتوان گفت تعداد فسفولیپید های به کار رفته در غشا میتواند متغیر باشد.
۶. ترکیب با یازدهم - پروتئین های پرفورین و مکمل با ایجاد منفذ در غشای یاخته «»»» یکپارچگی غشا را از بین می برد.



ورود مواد به یاخته و خروج از آن


انتشار ساده: جریان مولکول ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت (در جهت شیب غلظت) انتشار نام دارد. نتیجه نهایی انتشار هر ماده، یکسان شدن غلظت آن در محیط است. مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می توانند منتشر شوند. بنابراین در صورتی که ماده به روش انتشار از غشا عبور کنند، یاخته انرژی مصرف نمی کند. مولکول هایی مانند اکسیژن و کربن دی اکسید با این روش از غشا عبور می کنند (شکل ۱۱).



شکل ۱۱- انتشار ساده

انتشار تسهیل شده: در این روش پروتئین های غشا،

انتشار مواد را تسهیل می کنند و مواد را در جهت شیب غلظت آنها، از غشا عبور می دهند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- انتشار تسهیل شده


گذرندگی (اسمز): شکل ۱۳ را ببینید. در یک طرف

غشای نازکی که نفوذ پذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد، آب خالص و در طرف دیگر آن، محلول شکر وجود دارد. حجم مواد در دو طرف غشا یکسان است. فقط مولکول های آب می توانند از غشا عبور کنند؛ در این حالت، تعداد مولکول های آب در واحد حجم، در سمت راست بیشتر است و این مولکول ها بیشتر به سمت چپ منتشر می شوند. به انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی، اسمز می گویند.

فشار لازم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی محلول نام دارد. هرچه تفاوت تعداد مولکول های آب در واحد حجم، در دو سوی غشا بیشتر باشد، فشار اسمزی بیشتر است و آب


سریع تر جابه جا می شود. جابه جایی خالص آب از محیطی با فشار اسمزی کمتر به محیطی با فشار اسمزی بیشتر است.

همان طور که در شکل می بینید در اثر اسمز، حجم محلول سمت چپ افزایش می یابد. آیا این پدیده برای یاخته ها در بدن ما هم رخ می دهد؟ آیا ممکن است ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز موجب ترکیدن یاخته های بدن ما شود؟ خیر. فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها تقریباً مشابه درون آنهاست، در نتیجه آب بیش از حد وارد نمی شود و یاخته ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند.




شکل ۱۳- اسمز

انتقال فعال: فرایندی که در آن، ماده را برخلاف شیب غلظت منتقل می‌کند، انتقال فعال نام دارد. در این فرایند، مولکول‌های پروتئین با صرف انرژی، ماده‌ای را برخلاف شیب غلظت منتقل می‌کنند (شکل ۱۴). این انرژی می‌تواند از مولکول «ATP» به دست آید. مولکول ATP شکل رایج انرژی در یاخته است.



شکل ۱۴- انتقال فعال

درون‌بری (آندوسیتوز) و برون‌رانی (اکزوسیتوز): بعضی یاخته‌ها می‌توانند ذره‌های بزرگ را با فرایندی به نام درون‌بری جذب کنند. برون‌رانی فرایند خروج ذره‌های بزرگ از یاخته است. این فرایندها با تشکیل ریز کیسه‌ها همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد (شکل ۱۵).



شکل ۱۵- (الف) برون‌رانی، (ب) درون‌بری

انتشار ساده: در جهت شیب بدون نیاز به پروتئین و بدون نیاز به انرژی زیستی (با انرژی جنبشی) نتیجه نهایی انتشار هم‌واره، یکسان شدن غلظت آن در محیط است.

انتشار تسهیل شده: در جهت شیب به کمک پروتئین کانالی و بدون نیاز به انرژی زیستی

انتقال فعال: برخلاف شیب به کمک پروتئین ناقل (پمپ) و با صرف انرژی زیستی

اسمزه: انتشار آب از غشا با تراوایی نسبی از محیط با فشار اسمزی کمتر به محیط با فشار اسمزی بیشتر
فشار لازم برای توقف کامل اسمزه، فشار اسمزی مطلق نام دارد.

درون‌بری: ورود با صرف انرژی زیستی و با کیسه غشایی در بعضی یاخته‌ها

برون‌رانی: خروج با صرف انرژی زیستی و با کیسه غشایی در بعضی یاخته‌ها

مولکول‌های
کوچک

مولکول‌های
بزرگ

روش‌های عبور
مواد از غشا

13 - کدام موارد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

<< در یاخته های جانوری نوعی شبکه آندوپلاسمی که..... کمک رناتن ها به تولید ترکیبات زیستی می پردازد>>

الف) به غشای هسته یاخته چسبیده است. بدون (ب) به صورت کیسه های روی هم قرار گرفته است. با

ج) در تولید مولکول های واجد نیتروژن موثر است. بدون (د) گستردگی بیشتری در فضای درون یاخته دارد ، با

1) الف - ج 2) ب - د 3) الف - د 4) ب - ج

14 - کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است ؟

- 1) به صورت استوانه ای است ، در تقسیم یاخته ای نقش دارد
- 2) دارای دو غشا در اطراف خود است ، منبع اصلی تامین انرژی یاخته می باشد
- 3) به صورت کیسه است ، انواعی از آنزیم ها را برای تجزیه مواد دارد
- 4) در بسته بندی و ترشح مواد نقش دارد ، شامل لوله ها و کیسه ها می باشد

15 - در ارتباط با سیتوپلاسم یاخته های جانوری ، کدام گزینه صادق است ؟

- 1) ماده زمینه آن شامل اندامک ها ، آب و مواد دیگر است
- 2) فضای درون غشای یاخته و فضای درون هسته را پر میکند
- 3) تولید مولکول های پروتئینی در فضای درونی آن غیرممکن است
- 4) شبکه ای از لوله ها و کیسه ها به صورت گسترده می تواند در آن دیده شود

16 - در ارتباط با غشای گویچه های قرمز ، کدام گزینه صحیح است ؟

- 1) همه کربوهیدرات های متصل به اجزای پروتئینی ، فاقد انشعاب است
- 2) همه مولکول های پروتئینی سطح غشای یاخته ، توسط ژنی موجود در هسته تولید شده اند.
- 3) همه مولکول های لیپیدی ، ساختار مشابهی داشته و در یک سطح از غشای یاخته دیده میشوند
- 4) همه واحد های سازنده کربوهیدرات های متصل به اجزای غشای یاخته ، حداقل با یک واحد دیگر پیوند دارند

17 - چند مورد عبارت زیر را درست تکمیل نمی کند؟

<< در حین انتقال مواد بین دو سمت غشای یاخته ، هر زمانی که مولکول آندونوزین تری فسفات به طور مستقیم ، مصرف.....>>

- الف) نمی شود، مواد در جهت شیب غلظت جابجا میگردند (ب) میشود ، میزان فسفولیپیدهای غشای یاخته تغییر میکند
- ج) می شود ، نوعی مولکول پروتئینی غشای یاخته فعالیت می کند (د) نمی شود ، به وجود نوعی غشا با خاصیت تراوایی کامل نیاز است

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

18 - کدام گزینه در رابطه با انتشار ساده برخلاف برون رانی درست است؟

- 1) شکل رایج انرژی در یاخته ، مصرف میشود
- 2) پروتئین های کانالی موجود در غشا فعالیت میکنند
- 3) بدون نقش ریز کیسه های غشایی انجام میگیرد
- 4) فرایندی مشابه خروج سدیم از نورون محسوب میشود

بافت های بدن انسان

می دانید بافت های بدن انسان را می توان به چهار نوع پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی دسته بندی کرد. در اندام ها و دستگاه های بدن انواع بافت ها به نسبت های متفاوت وجود دارند.

بافت پوششی: بافت پوششی، سطح بدن و سطح حفره ها و مجاری درون بدن (مانند دهان، معده، روده ها و رگ ها) را می پوشاند. یاخته های این بافت، به یکدیگر بسیار نزدیک اند و بین آنها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد. در زیر یاخته های این بافت، بخشی به نام غشای پایه وجود دارد که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت های زیر آن، متصل نگه می دارد. غشای پایه، شبکه ای از رشته های پروتینی و گلیکوپروتینی است. یاخته های بافت پوششی به شکل های متفاوتی مانند سنگ فرشی، مکعبی و استوانه ای در یک یا چند لایه سازمان می یابند (شکل ۱۶).

بافت پیوندی: بافت پیوندی از انواع یاخته ها، رشته های پروتینی، مانند رشته های کلاژن و رشته های کشسان (ارتجاعی) و ماده زمینه ای تشکیل شده است. ماده زمینه ای بافت پیوندی، ممکن است مایع، جامد و یا نیمه جامد باشد. در ادامه به انواع بافت پیوندی می پردازیم.


در بافت پیوندی **سست** ماده زمینه ای شفاف، بی رنگ، چسبنده و مخلوطی از انواع مولکول های درشت، مانند گلیکوپروتئین است. این بافت معمولاً بافت پوششی را پشتیبانی می کند. در بافت پیوندی **متراکم** میزان رشته های کلاژن از بافت پیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته های آن کمتر و ماده زمینه ای آن نیز اندک است؛ بنابراین مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست بیشتر است. در زردپی و رباط بافت پیوندی متراکم وجود دارد. بافت چربی نیز نوعی بافت پیوندی است که در آن یاخته های سرشار از چربی فراوان است. این بافت بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است. بافت چربی نقش ضربه گیری دارد و به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند. خون، بافت های استخوانی و غضروفی، انواع دیگر بافت پیوندی هستند که به تدریج با آنها آشنا می شوید.




مکعبی یک لایه ای گردیزه (فقرن)



سنگ فرشی یک لایه ای (دیواره مویرگ)
غشای پایه




سنگ فرشی چند لایه ای (مری)



استوانه ای یک لایه ای (روده)

شکل ۱۶- انواع بافت پوششی



شکل ۱۷- انواع بافت پیوندی:

الف) سست

ب) متراکم

پ) بافت چربی

بافت های بدن انسان

طبقه بندی یاخته های بافت پوششی (بر اساس شکل)		
نوع		محل قرار گیری
(۱) سنگفرشی	یک لایه	مویرگ / اندوکارد قلب / اندومتر رحم / دیواره بیرونی کپسول بومن / کیسه های هوایی
	چند لایه + شاخی	پوست قسمت های بدن
	چند لایه + مخاطی	ابتدای بینی (پوست) / دهان تا بنداره انتهای مری (کاردیا) / زبان
(۲) استوانه ای	مژک دار	دستگاه تنفس «» میان بینی / نای / نایژه / نایژک
	غیر مژک دار	سقف حفره بینی
	ریز پرز دار	روده باریک
(۳) مکعبی	معمولی	غده تیروئید
	ریز پرز دار	لوله های نفرون (میزان ریز پرز در لوله پیچ خورده نزدیک فراوان تر است)
(۴) قاعده ای		مخاط مژک دار تنفسی (مثلا نای و سقف بینی) / جوانه چشایی
(۵) پودوسییت		دیواره درونی کپسول بومن (کلیه)
(۶) یاخته های نوع ۲ دیواره حبابک		کیسه های حبابکی (شش) / ترشح سورفکتانت / دارای زوائد غشایی
(۷) یاخته های کناری معده		درون غدد معده / دارای زوائد غشایی


بافت پوششی	سنگفرشی یک لایه	درون شامه - برون شامه - پیراشامه - اطراف دریچه های قلب - لایه داخلی رگها - سلولهای نوع یک حبابک - دیواره بیرونی کپسول بومن
	سنگفرشی چند لایه	اپی درم پوست - دهان - زبان - حلق - مری
	مکعبی ریز پرز دار	لوله پیچ خورده نزدیک
	استوانه ای مژک دار	بخش های هادی دستگاه تنفس - لوله فالوپ
	استوانه ای ریز پرز دار	روده باریک
	استوانه ای بدون ریز پرز و بدون مژک	معده - روده بزرگ
	پودوسییتی	دیواره درونی کپسول بومن

انواع بافت پوششی بر اساس پشتیبانی شدن		
بافت پوششی		مثال
بدون پشتیبانی		یاخته نوع ۱ حبابک
با پشتیبانی	بافت پیوندی سست	معمولا بافت پوششی را پشتیبانی می کند
	بافت پیوندی متراکم (رشته ای)	پوست «» تولید چرم لایه های اپی کارد و پریکارد قلب

نکات بافت پیوندی:


۱. غشای پایه برای بافت پیوندی تعریف نمی‌شود «» به جای آن ماده زمینه‌ای دارند.
۲. همواره ماده زمینه‌ای توسط خود یاخته‌های تشکیل دهنده بافت پیوندی ایجاد می‌شود.
۳. رشته‌های کلاژن و کشسان، بخشی از ماده زمینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شوند «» در ماده زمینه‌ای پروتئینی‌هایی غیر از این دو پروتئین وجود دارد.
۴. در هر بافت پیوندی رشته‌های کلاژن و کشسان دیده نمی‌شود «» مانند بافت پیوندی خون
۵. هر یاخته‌ی بافت پیوندی همواره درون ماده زمینه‌ای آن قرار ندارد «» بافت پیوندی خون

بافت ماهیچه‌ای: در گذشته، با انواع بافت‌های ماهیچه‌ای در بدن انسان آشنا شدید (شکل ۱۸).



شکل ۱۸- انواع بافت ماهیچه‌ای:
الف) مخطط (اسکلتی)
ب) قلبی
پ) صاف

بافت عصبی: می‌دانید یاخته‌های عصبی (نورون‌ها)، یاخته‌های اصلی بافت عصبی هستند (شکل ۱۹). این یاخته‌ها با یاخته‌های بافت‌های دیگر مانند یاخته‌های ماهیچه ارتباط دارند. یاخته‌های عصبی یاخته‌های ماهیچه را تحریک می‌کنند تا منقبض شوند.



شکل ۱۹- یاخته عصبی

سراسری ۱۴۰۱-دی

۳۷. در ارتباط با مری انسان، کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟
«در بافت پیوندی سستی که به لایه زیر مخاط تعلق دارد، رشته‌های کلاژن رشته‌های کشسان،»
- (۱) برعکس - تراکم بسیار کمی دارند.
(۲) نسبت به - قطر بیشتری دارند.
(۳) همانند - به صورت دستجاتی موازی با هم قرار گرفته‌اند.
(۴) برخلاف - در مجاورت یاخته‌هایی با هسته کشیده واقع شده‌اند.

19 – چند مورد درباره یاخته های عصبی انسان درست است ؟ (سراسری نوبت اول 1402)

- الف) میزان عبور مولکول های آب از عرض غشا ، با کاهش اختلاف یون های دو سوی غشا ، بیشتر میشود
 ب) عبور یون ها ، برخلاف شیب غلظت از عرض هر غشا ، فقط در پی هیدرولیز نوعی مولکول پر انرژی ممکن است
 ج) عبور مولکول های درشت از عرض غشا ، میتواند در پی تغییر تعداد مولکول های سازنده آن غشا صورت بگیرد
 د) عبور مواد برخلاف شیب غلظت از عرض غشا ، به طور حتم ، در پی تغییر وضعیت قرارگیری بعضی از پروتئین های غشا رخ می دهد

4 (4

3 (3

2 (2

1 (1

20 – کدام گزینه در مورد بافت پیوندی سست صحیح بیان شده است ؟

- 1) یاخته هایی به صورت منظم داشته و هسته کوچک و فشرده در زوائد یاخته ای آن جای گرفته است
 2) رشته های افزایشده مقاومت به میزان کمتری نسبت به بافت پیوندی متراکم در آن قابل مشاهده هستند
 3) فضای اندک بین یاخته های خود را با ماده زمینه ای بی رنگ، چسبنده و شفاف و دارای مولکول درشت پر میکند
 4) همواره شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی متصل بوده و در پشتیبانی از یاخته های پوششی نقش دارد

21 – نوعی بافت پیوندی در بدن انسان که نقش ضربه گیر و عایق حرارتی را بر عهده دارد.....

- 1) قادر به تغییر اندازه خود بوده و مرکز تنظیم ژنتیک خود را در قسمت مرکزی جای داده است
 2) به همراه طحال در ذخیره لیپید های حاصل از گوارش غذا نقش دارد
 3) فاقد فضای بین یاخته ای بوده و بیش ترین حجم یاخته های آن چربی تشکیل میدهد
 4) در اطراف سرخرگ ها و سیاهرگ های اکلیلی سطح قلب قابل مشاهده هست

22 – چند مورد ، از عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟

>> در بدن انسان سالم ، اگر یاخته ای.....داشته باشد، قطعاً متعلق به بافتی است که <<.....>>

- الف) ظاهر دوکی شکل – تحت تاثیر فعالیت تحریکی یاخته های اصلی بافت عصبی منقبض می شود
 ب) هسته رانده شده به مجاورت غشای یاخته ای – بزرگترین ذخیره انرژی در بدن محسوب میشود
 ج) با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ، تماس – یاخته ها ، فضای بین یاخته ای اندکی دارد
 د) انشعابات سیتوپلاسمی در سطح خود – ماده زمینه ای چسبنده آن مخلوطی از انواع مولکول های درشت دارد

4 (4

3 (3

2 (2

1 (1