

۱ نشان دهید برای محاسبه فاصله کانونی یک دیش مخابراتی باید قطر دهانه دیش را در خودش ضرب کرد و حاصل ضرب را بر اندازه گودی (عمق) دیش تقسیم کرد و عدد حاصل را بر ۱۶ تقسیم نمود.

۲ وضعیت نسبی دو دایره $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 8$ و $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 12 = 0$ را بررسی کنید.

۳ معادله مکان هندسی نقاطی از صفحه R^2 را که فاصله آنها از $A(1, 3)$ مساوی $\sqrt{3}$ برابر فاصله آنها تا $B(0, -2)$ باشد را بیابید.

۴ دایره‌ای بر هر دو محور مختصات مماس است و مرکز آن روی خط $x + y = 6$ قرار دارد، معادله دایره را بنویسید.

۵ پاره خط AB به طول ۳ مفروض است. مکان هندسی نقطه M از صفحه را که در تساوی $\frac{MA - MB}{MA - 2} = 2$ صدق می‌کند به دست آورید.


۶ طول وتری را که دایره $x^2 + y^2 - 2x - 8y = 8$ از خط $5x + 12y = 14$ جدا می‌کند به دست آورید.

۷ یک آینه مقعر سهمی شکل داریم، (بیرون سهمی جیوه اندود و داخل سهمی آینه است.) که مختصات کانون نقطه $(-3, 2)$ و معادله خط هادی آن $x = 1$ است.

الف) معادله سهمی را بنویسید.

ب) اگر پرتو نوری در داخل سهمی از کانون عبور کند و در نقطه به طول ۳- با سهمی برخورد کند، معادله پرتوی بازتابش را بنویسید.


۸ در شکل قطر دایره برابر قطر بیضی است و از کانون F عمودی بر AA' رسم کرده‌ایم تا دایره را در نقطه M قطع کند. ثابت کنید MF با نصف قطر کوچک بیضی برابر است.



۹ یک نقطه دلخواه مانند M درون بیضی در نظر بگیرید نشان دهید مجموع فواصل M از دو کانون بیضی کمتر از $2a$ است.

۱۰ در شکل مقابل، سهمی با رأس A و کانون F و خط هادی d رسم شده است. از F به نقطه دلخواه M روی سهمی وصل کرده و امتداد داده‌ایم تا d را در نقطه N قطع کند و از نقطه M، MT را بر d عمود کرده‌ایم.

ثابت کنید: $\frac{FN}{FA} = \frac{2NT}{TH}$




۱۱ مقدار c را چنان بیابید که دایره $x^2 + y^2 - 2x + 2y + c = 0$ بر دایره $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$ مماس بیرون باشد.

۱۲ در یک دیش مخابراتی به شکل سهموی با دهانه دایره‌ای به قطر ۶۰ واحد و گودی (عمق) ۹ واحد مفروض است فاصله کانونی این دیش را به دست آورید.


۱۳ نقطه A و خط d در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای را بیابید که از A به فاصله ۲ سانتی‌متر و از خط d به فاصله ۳ سانتی‌متر باشد. بحث کنید.

۱۴ دو دایره‌ی $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 18 = 0$ و $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0$ نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

۱۵ در بیضی زیر اگر طول قطرهای آن ۱۲ و $4\sqrt{2}$ باشد، مساحت مثلث هاشور زده شده را حساب کنید.



۱۶ نقطه M روی بیضی به اقطار ۶ و ۱۰ واحد به گونه‌ای قرار دارد که فاصله آن تا مرکز بیضی برابر ۴ واحد است. در صورتی که بدانیم مثلث MFF' قائم‌الزاویه است، طول MF را به دست آورید. (F و F' کانون‌های بیضی هستند).




۱۷ نقطه‌ی M روی بیضی به اقطار ۶ و ۱۰ واحد به گونه‌ای قرار دارد که فاصله‌ی آن تا مرکز بیضی برابر ۴ واحد است.

الف) نشان دهید $OM = OF = OF'$

ب) نشان دهید مثلث MFF' قائم‌الزاویه است.

ج) طول‌های MF و MF' را به دست آورید.



۱۸ دو نقطه‌ی A و B روی یک بیضی و F و F' کانون‌های بیضی‌اند. A به کانون F' نزدیک‌تر و B به کانون F نزدیک‌تر است.

اگر $AF' = BF$ باشد، نشان دهید:

الف) در حالتی که دو پاره خط AF و BF' یک‌دیگر را درون بیضی قطع نکنند، با هم موازی‌اند.

ب) در حالتی که AF و BF' یک‌دیگر را درون بیضی و در نقطه‌ای مانند M قطع کنند، مثلث FMF' متساوی‌الساقین است و M روی قطر کوچک بیضی است.

۱۹ نقطه‌ی A و خط d در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای بیابید که از A به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر و از d به فاصله‌ی ۳

سانتی‌متر باشد (بحث کنید).

۲۰ مکان هندسی را به کمک استدلال استقرایی حدس بزنید.


مکان هندسی مرکز دایره‌هایی که در یک نقطه‌ی مشخص بر یک خط داده شده مماس باشد.



فرض کنید شکل مقابل یک دیش مخابراتی با قطر دهانه $2R$ و عمق h باشد. با توجه به شکل سهمی با رأس $S(0, 0)$ است و دهانه آن رو به بالا است و فاصله کانونی آن را $SF = a$ در نظر می‌گیریم پس معادله این سهمی به صورت $x^2 = 4ay$ است. نقطه A به طول R و عرض h روی این سهمی قرار دارد. بنابراین:

$$A(R, h) \in \text{سهمی} \Rightarrow R^2 = 4ah \Rightarrow a = \frac{R^2}{4h}$$

پس فاصله کانونی این دیش برابر $\frac{R^2}{4h}$ است که مساوی $\frac{4R^2}{16h}$ یعنی مساوی مربع قطر دهانه دیش تقسیم بر گودی آن و تقسیم بر ۱۶ است.



مرکز و شعاع‌های هر دو دایره را به دست می‌آوریم:

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y - 8 = 0$$

$$\begin{cases} O\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right) = (1, -3) \\ R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}}{2} = \frac{\sqrt{4 + 36 + 32}}{2} = \frac{\sqrt{72}}{2} = 3\sqrt{2} \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 + 8x - 4y + 12 = 0$$

$$\begin{cases} O'\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right) = (-4, 2) \\ R' = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}}{2} = \frac{\sqrt{64 + 16 - 48}}{2} = \frac{\sqrt{32}}{2} = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$d = OO' = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

از طرف دیگر طول خط‌المركزين برابر است با:

توجه کنید که $d = R + R' = (3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}$ ، بنابراین دو دایره مماس خارجی هستند.

$$MA = \sqrt{3} MB$$

فرض می‌کنیم $M(x, y)$ نقطه‌ای از مکان موردنظر باشد. بنابر فرض مسئله:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2} &= \sqrt{3} \sqrt{(x-0)^2 + (y+2)^2} \xrightarrow{\text{توان ۲}} x^2 + 1 - 2x + y^2 + 9 - 6y \\ &= 3(x^2 + y^2 + 4 + 4y) \end{aligned}$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2x + 18y + 2 = 0 \xrightarrow{\text{تقسیم بر ۲}} x^2 + y^2 + x + 9y + 1 = 0$$

در این معادله ضرایب x^2 و y^2 با هم برابر است و $a^2 + b^2 - 4c = 1 + 81 - 4 > 0$ ، بنابراین مکان مورد نظر یک دایره است.

۴

روش اول: مرکز دایره روی خط $O = (\alpha, 6 - \alpha) : x + y = 6$

فاصله مرکز از دو خط $x = 0$ و $y = 0$ یکسان و با شعاع دایره مساوی است:

$$\begin{cases} d = \alpha \\ d' = 6 - \alpha \end{cases} \Rightarrow \alpha = 3 \Rightarrow \begin{cases} O = (3, 3) \\ r = 3 \end{cases} \Rightarrow C : (x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$$

روش دوم: مرکز دایره‌هایی که بر هر دو محور مماس هستند، روی خطوط $y = \pm x$ قرار دارد. همچنین مرکز دایره روی خط $x + y = 6$ است. بنابراین مرکز دایره روی خط $y = +x$ و $x + y = 6$ قرار دارد. بنابراین مرکز دایره $(3, 3)$ و شعاع

۳ است. معادله دایره برابر با $C : (x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$

۵

از تساوی داده شده در مسئله نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{MA - MB}{MA - 2} = 2 \Rightarrow MA - MB = 2MA - 4 \Rightarrow MA + MB = 4$$

بنابراین مجموع فاصله‌های نقطه M از دو نقطه A و B مقدار ثابت ۴ است و این مقدار از فاصله دو نقطه A و B بیشتر است ($AB = 3$).

پس مکان هندسی نقطه M بیضی با کانون‌های A و B و مقدار ثابت ۴ است.

۶


فرض کنید خط $5x + 12y = 14$ دایره را در نقاط A و B قطع کند، برای پیدا کردن اندازه وتر AB فاصله OH و شعاع R را به دست آورده در مثلث قائم‌الزاویه $OA H$ طول AH را تعیین و آن را دو برابر می‌کنیم، زیرا نقطه H وسط وتر AB

$$x^2 + y^2 - 2x - 8y = 8 \Rightarrow O\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right) = (1, 4) \text{ است.}$$

$$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}}{2} = \frac{\sqrt{4 + 64 + 32}}{2} = 5$$

$$OH = \frac{|5 + 48 - 14|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{39}{\sqrt{169}} = \frac{39}{13} = 3 \text{ پس:}$$

$$\Delta OAH : AH^2 = OA^2 - OH^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \Rightarrow AH = 4 \text{ بنابراین:}$$



در نتیجه $AB = 2AH = 8$.

۷

$$\text{الف) } \begin{cases} A(-1, 2) \\ a = 2 \end{cases} \Rightarrow (y - 2)^2 = -8(x + 1)$$

ب) پرتویی که در داخل سهمی از کانون عبور کند، به موازات محور کانونی سهمی $y = 2$ بازتاب می‌کند. بنابراین پرتوهای بازتابش موازی این خط هستند.

$$(y - 2)^2 = -8(x + 1) \xrightarrow{x=-3} \begin{cases} P : (-3, 2) \\ P' : (-3, 6) \end{cases} \Rightarrow y = 6, y = -2$$


^

$$\overset{\Delta}{OMF} : OM^r = MF^r + OF^r \xrightarrow{OM=a, OF=c} a^r = MF^r + c^r$$

یس MF مساوی نصف قطر کوچک بیضی است.

9

1.

$$\frac{\text{NF}}{\text{FH}} = \frac{\text{NH}}{\text{TH}} \Rightarrow \frac{\text{NF}}{\text{rFA}} = \frac{\text{NT}}{\text{TH}} \Rightarrow \frac{\text{NF}}{\text{FA}} = \frac{\text{rNT}}{\text{TH}}$$


٧٠



۱۲

اگر قطر دهانه دیش را با $2r$ و گودی را با h نمایش دهیم. فاصله کانونی برابر $a = \frac{r^2}{16h}$ است.

$$a = \frac{(2r)(2r)}{16h} = \frac{60 \times 60}{16(9)} = 25$$

$2r = 60, h = 9$ با جایگذاری در رابطه فوق داریم:

$$a = \frac{r^2}{4h} = \frac{(30)^2}{4(9)} = 25 \quad (\text{اگر رابطه فوق به صورت } a = \frac{r^2}{4h} \text{ نوشته شود درست است.})$$


۱۳

مکان هندسی نقاطی که از A به فاصله ۲ سانتی‌متر باشد یک دایره به مرکز A و شعاع ۲ سانتی‌متر است این دایره را رسم می‌کنیم. نقاطی که از خط d به فاصله ۳ سانتی‌متر باشد دو خط d', d'' در طرفین خط d و به موازات d است این دو خط را رسم می‌کنیم محل برخورد دو خط d', d'' با دایره مطابق شکل جواب مسأله است.

اگر یکی از دو خط d' یا d'' دایره را قطع کند مسأله ۲ جواب دارد.

اگر یکی از دو خط d' یا d'' بر دایره مماس باشد مسأله ۱ جواب دارد.

اگر هیچ‌یک از دو خط d' یا d'' دایره را قطع نکند مسأله جواب ندارد.



۱۴

$$x^2 + y^2 - 2x - 10y + 18 = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \\ 2y - 10 = 0 \Rightarrow y = 5 \end{cases} \Rightarrow O \begin{cases} h = 1 \\ k = 5 \end{cases}$$


$$R = \sqrt{h^2 + k^2 - F} = \sqrt{1 + 25 - 18} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3 \\ 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = 1 \end{cases} \Rightarrow O' \begin{cases} h' = -3 \\ k' = 1 \end{cases}$$

$$R' = \sqrt{h'^2 + k'^2 - F'} = \sqrt{9 + 1 - 8} = \sqrt{2}$$

$$OO' = \sqrt{(1+3)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$OO' > R + R' \Rightarrow$ دو دایره متخارج هستند



$$2a = 12 \Rightarrow a = 6$$

$$2b = 4\sqrt{2} \Rightarrow b = 2\sqrt{2}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 36 = 8 + c^2 \Rightarrow c^2 = 28 \Rightarrow c = 2\sqrt{7}$$

$$S_{\triangle BFF'} = \frac{b \times 2c}{2} = \frac{2\sqrt{2} \times 4\sqrt{7}}{2} = 4\sqrt{14}$$


۱۵

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$$

$$MF + MF' = 2a = 10 \rightarrow MF' = 10 - MF$$

$$(MF)^2 + (MF')^2 = (FF')^2 \rightarrow (MF)^2 + (10 - MF)^2 = 16^2 \rightarrow MF = 5 \pm \sqrt{7}$$

۱۶



الف) $OM = OF = OF'$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4 = OF = OF'$$

۱۷

ب) در مثلثی که میانه نظیر یک ضلع آن نصف آن ضلع باشد قائم الزویه است در رأس روبه‌رو به ضلع نصف شده است.

ج) $x + y = 2a = 10 \Rightarrow y = 10 - x$


$$x^2 + y^2 = FF'^2 = 16 \Rightarrow x^2 + (10 - x)^2 = 16 \Rightarrow 2x^2 - 20x + 36 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x + 18 = 0$$

$$x_1, x_2 = 5 \pm \sqrt{7}$$

$$x = 5 + \sqrt{7} \Rightarrow y = 5 - \sqrt{7} \Rightarrow MF' = 5 + \sqrt{7}, MF = 5 - \sqrt{7}$$


$$x = 5 - \sqrt{7} \Rightarrow y = 5 + \sqrt{7}$$



الف)
$$\left. \begin{aligned} AF' + AF &= 2a \\ BF' + BF &= 2a \\ BF &= AF' \end{aligned} \right\} \Rightarrow AF = BF'$$

۱۸

چهارضلعی که اضلاع آن دوبه‌دو مساوی باشند متوازی‌الاضلاع است پس $AF \parallel BF'$




ب)
$$\left. \begin{aligned} AF' + AF &= 2a \\ BF' + BF &= 2a \\ BF &= AF' \end{aligned} \right\} \Rightarrow \triangle AFF' \cong \triangle BFF'$$

$$\Rightarrow AF = BF', \angle F_1 = \angle F'_1$$


$$\Rightarrow \triangle OFF' \text{ متساوی الساقین است}$$




دایره‌ای به مرکز A و به شعاع ۲ سانتی‌متر را رسم می‌کنیم و دو خط موازی d به فاصله ۳ سانتی‌متر در دو طرف آن رسم می‌کنیم محل تقاطع (در صورت وجود) جواب مسئله است که ممکن است دو نقطه، یا یک نقطه و یا نقطه‌ای نباشد.



نقطه مشترک ندارند



دو نقطه مشترک دارند



یک نقطه مشترک دارند

مرکز چنین دایره‌هایی که در نقطه‌ی A به خط d مماس هستند یک خط می‌باشد که در نقطه‌ی A بر d عمود می‌باشد.

