



۱ مطابق با مطالب کتاب درسی، همه فرایندهای آزاد شدن انرژی از گلوکز را که در گیاهان می‌تواند رخ دهد، در نظر بگیرید. در کدام مورد، تولید یون مثبت غیرممکن است؟

- ۱ در واکنشی که پیش‌ماده، قندی دوفسفاته و فراورده‌ها قندهای تک‌فسفاته هستند.
- ۲ در واکنشی که فراورده نسبت به پیش‌ماده، یک گروه فسفات بیشتر دارد.
- ۳ در واکنشی که فراورده نسبت به پیش‌ماده، اتم اکسیژن کمتری دارد.
- ۴ در واکنشی که پیش‌ماده و فراورده هر دو سه کربنی هستند.

۲ با توجه به زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP در راکیزه (میتوکندری)، کدام مورد، ویژگی ساختاری را نشان می‌دهد که توانایی انتقال پروتون‌ها را دارد و می‌تواند الکترون‌ها را از سطح خارجی غشای درونی راکیزه دریافت کند؟

- ۱ می‌تواند بر فعالیت پاداکسنده‌ها مؤثر باشد.
- ۲ فعالیت آن، مستقیماً به شیب غلظت نوعی یون وابسته است.
- ۳ قسمت عمده این ساختار، در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) قرار دارد.
- ۴ مستقیماً از یکی از محصولات واکنش‌های قندکافت، الکترون‌ها را دریافت می‌کند.

۳ در هر فرد ضمن فعالیت‌های ورزشی زیاد و در جریان تأمین انرژی از مولکول‌های گلوکزی که از روده جذب شده‌اند، کدام‌یک از واکنش‌های زیر، در هر دو بخش اصلی سیتوپلاسم یاخته ماهیچه دلتایی انجام‌پذیر است؟

- ۱ کاهش نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی
- ۲ تولید نوعی اسید سه‌کربنی دو فسفاته
- ۳ تولید کربن دی‌اکسید
- ۴ تولید مولکول پنج‌کربنی

۴ با توجه به زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP در راکیزه (میتوکندری) و در ارتباط با ساختاری که توانایی انتقال پروتون‌ها را دارد و می‌تواند الکترون‌ها را از سطح خارجی غشای درونی راکیزه (میتوکندری) دریافت کند، کدام مورد نادریست است؟

- ۱ به طور غیرمستقیم به انرژی شیب غلظت نوعی از یون‌ها نیازمند است.
- ۲ همواره با انتقال الکترون‌ها به اکسیژن، آب را در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) تولید می‌کند.
- ۳ قسمت عمده این ساختار، در غشای داخلی راکیزه (میتوکندری) قرار دارد.
- ۴ به طور غیرمستقیم از یکی از محصولات واکنش‌های قندکافت، الکترون‌ها را دریافت می‌کند.

۵ با توجه به بخشی از یک چرخه کربس که در آن نوعی پیوند اشتراکی بین فسفات و نوعی نوکلئوتید برقرار می‌شود. کدام مورد نادریست است؟ (محل ورود استیل کوآنزیم A به چرخه، به عنوان محل آغاز چرخه در نظر گرفته می‌شود.)

- ۱ بعد از این بخش، آخرین مولکول چهارکربنی به وجود می‌آید.
- ۲ بعد از این بخش، دو نوع مولکول حامل الکترون تولید می‌شود.
- ۳ قبل از این بخش، نوعی ماده آلی آزاد می‌شود که برای فعالیت آنزیم ضروری است.
- ۴ قبل از این بخش، نوعی مولکول ایجاد می‌شود که غالباً از طریق ترکیب با هموگلوبین در خون حمل می‌شود.

۶ کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در انسان، فقط آن بخش از آنزیم ATP ساز که در داخلی راکیزه (میتوکندری) قرار دارد،»

- ۱ غشای - حاوی تعدادی قطعات مجزاست.
- ۲ فضای - می‌تواند به عبور پروتون‌ها کمک کند.
- ۳ فضای - منبع رایج انرژی یاخته را رها می‌سازد.
- ۴ غشای - می‌تواند الکترون بگیرد یا از دست بدهد.

۷ در راکیزه (میتوکندری) یک یاخته فعال جانوری، به دنبال دریافت $2e^-$ و $2H^+$ توسط مولکول پذیرنده، فراورده‌ای تولید می‌شود. ویژگی مشترک این نوع فراورده‌ها کدام است؟

- ۱ در ساختار خود، اتم اکسیژن دارند.
- ۲ در طی مرحله قندکافت (گلیکولیز) نیز تولید می‌شوند.
- ۳ در محل‌های متفاوتی از زنجیره انتقال الکترون به وجود می‌آیند.
- ۴ در واکنش تبدیل مولکول‌های درشت به مولکول‌های کوچک‌تر مصرف می‌شوند.

۸ به هنگام تجزیه‌ی یک مولکول گلوکز، طی اولین مرحله‌ی تنفس در یاخته‌ی ماهیچه‌ای انسان و به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سه کربنی دوفسفاته، کدام مورد به‌ترتیب تولید و مصرف می‌شود؟

- ۱ $1 NAD^+$ و $2 ADP$
- ۲ $2 NAD^+$ و $2 ATP$
- ۳ $2 NADH$ و $2 ATP$
- ۴ $1 NAD^+$ و $2 ADP$

۹ سیانید به کدام طریق بر یاخته‌ی جانوری تأثیر می‌گذارد؟

- ۱ آنزیم ATP ساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال می‌سازد.
- ۲ مانع از پمپ شدن یون‌های هیدروژن به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) می‌شود.
- ۳ از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل می‌آورد.
- ۴ ابتدا بر تجزیه‌ی $NADH$ تأثیر می‌نماید.

۱۰ کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«آن دسته از تارهای ماهیچه‌ی اسکلتی که در آن‌ها بیش از سایر تارهاست»

- ۱ فعالیت آنزیم تجزیه‌کننده‌ی ATP سرمیوزین - در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند.
- ۲ مقدار رنگ دانه‌ی قرمز - فعالیت آنزیم‌های مؤثر در چرخه‌ی کربس آن‌ها مهار گردیده است.
- ۳ مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی - با سرعت کندتری سارکومرهای خود را کوتاه می‌کنند.
- ۴ سرعت آزاد شدن یون‌های کلسیم از شبکه‌ی سارکوپلاسمی - در سیتوپلاسم خود، ساختارهای دوغشایی اندکی دارند.

کدام عبارت، درباره‌ی زنجیره‌ی انتقال الکترون موجود در غشای درونی میتوکندری یک سلول کبدی انسان، درست است؟

- ۱) یون‌های هیدروژن را در خلاف جهت شیب تراکم، از عرض غشا عبور می‌دهند.
- ۲) همه‌ی ترکیب‌های گیرنده یا دهنده‌ی الکترون، در بین دو لایه غشای درونی میتوکندری قرار دارند.
- ۳) هر ترکیب دریافت‌کننده الکترون، یون هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد می‌کند.
- ۴) انرژی الکترون‌های عبوری از زنجیره، صرف تلمبه کردن یون‌های هیدروژن به بخش داخلی میتوکندری می‌شود.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«تعدادی از جانداران، برای تأمین انرژی از گلوکز، اسید دو فسفات را طی مراحل به ترکیب دوکربنی تبدیل می‌کنند. در همه این جانداران، طی این مراحل می‌شود.»

- ADP مصرف و CO_2 آزاد
- NAD^+ مصرف و CO_2 آزاد
- NAD^+ تولید و NADH مصرف
- ATP تولید و NADH مصرف

- یک (۱) دو (۲) سه (۳) چهار (۴)

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در یک تار ماهیچه‌ای دلتایی»

- ۱) پاداکسند (آنتی‌اکسیدان) ها پس از اکسایش یافتن، می‌توانند نوکلئیک اسیدهای راکیزه (میتوکندری) را از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد حفظ کنند.
- ۲) محصول حاصل از قندکافت (گلیکولیز) همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه (میتوکندری) منتقل می‌شود.
- ۳) انواع مولکول‌های ناقل الکترون موجود در زنجیره، در کاهش pH فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) سهم متفاوتی دارند.
- ۴) سیانید می‌تواند با مهار تشکیل آب در بخش داخل راکیزه (میتوکندری)، مانع ساخته شدن ATP شود.

کدام عبارت، درباره‌ی هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم درست است؟

- ۱) نوعی باز آلی با ساختار حلقه‌ای دارد که به ریبوز متصل است.
- ۲) واحد تکرارشونده‌ی نوعی بسپار (پلیمر) محسوب می‌شود.
- ۳) در طی مرحله‌ی هوازی تنفس یاخته‌ای تولید می‌گردد.
- ۴) در ساختار خود گروه یا گروه‌های فسفات دارد.

کدام مورد، درباره یک تار ماهیچه‌ای دلتایی درست است؟

- ۱) سیانید می‌تواند با مهار تشکیل آب در فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) مانع ساخته شدن ATP شود.
- ۲) محصول حاصل از قندکافت (گلیکولیز) همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه (میتوکندری) منتقل می‌شود.
- ۳) پاداکسند (آنتی‌اکسیدان) ها پس از اکسایش یافتن، می‌توانند نوکلئیک‌اسیدهای راکیزه (میتوکندری) را از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد حفظ کنند.
- ۴) انرژی لازم برای انتقال H^+ ها به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری)، همواره از الکترون‌های FADH_2 و NADH حاصل از اکسایش گلوکز تأمین می‌شود.

برای تکمیل عبارت زیر، کدام گزینه، نامناسب است؟
 «اغلب تارهای ماهیچه دوسر بازوی یک ورزشکار دوی استقامت در مقایسه با اغلب تارهای ماهیچه دوسر بازوی یک وزنه‌بردار حرفه‌ای،» (با فرض اینکه این دو ورزشکار قبل از شروع تمرینات ورزشی، توده عضلانی مشابهی داشته باشند).

- ۱ در مجاورت رگ‌ها و مویرگ‌های خونی گسترده‌تری قرار دارند.
- ۲ حاوی مقادیر بیشتری از نوعی مولکول زیستی آهن‌دار هستند.
- ۳ سریع‌تر کلسیم را به داخل ماده زمینه‌سیتوپلاسم وارد می‌کنند.
- ۴ حاوی مقادیر بسیار زیادتری از آنزیم‌های مربوط به زنجیره انتقال الکترون هستند.

کدام مورد، در ارتباط با یک تار ماهیچه‌ای دلتایی درست است؟

- ۱ سیانید می‌تواند با مهار تشکیل آب در فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) مانع ساخته شدن ATP شود.
- ۲ محصول حاصل از قندکافت (گلیکولیز)، همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه (میتوکندری) منتقل می‌شود.
- ۳ پاداکسند (آنتی‌اکسیدان) ها پس از کاهش یافتن، می‌توانند نوکلئیک اسیدهای راکیزه (میتوکندری) را از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد حفظ کنند.
- ۴ انواع مولکول‌های ناقل الکترون شرکت‌کننده در زنجیره، در کاهش pH فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) سهم متفاوتی دارند.

CO_2 حاصل از یاخته‌های انسان می‌تواند با محصول واکنش دیگری ترکیب شود و در تنظیم pH محیط مؤثر باشد. کدام ویژگی، فقط درباره بعضی از این یاخته‌ها صادق است؟

- ۱ با تولید یک مولکول بدون فسفات از ترکیب دوفسفاته، انرژی لازم برای تولید ترکیباتی فسفات‌دار را فراهم می‌کنند.
- ۲ می‌توانند از محصول نوعی واکنش آب‌کافت (هیدرولیز)، در اولین مرحله از قندکافت (گلیکولیز) استفاده کنند.
- ۳ قادرند با روش‌های متفاوتی، شکل رایج و قابل استفاده انرژی یاخته را بسازند.
- ۴ آنزیم‌های لازم برای دریافت الکترون از حاملین الکترون را دارند.

نخستین جزء از زنجیره انتقال الکترون یک راکیزه (میتوکندری) که هم الکترون‌های مربوط به NADH و هم الکترون‌های مربوط به FADH_2 را دریافت می‌کند، چه مشخصه‌ای دارد؟

- ۱ پروتون‌ها را به فضای بین دو غشا پمپ می‌کند.
- ۲ ابتدا باعث می‌شود تا اکسیژن به یون اکسید تبدیل شود.
- ۳ ابتدا الکترون‌ها را به دومین محل پمپ‌کننده پروتون‌ها منتقل می‌کند.
- ۴ می‌تواند مستقیماً تحت تأثیر یون سیانید قرار گیرد و به صورت غیرفعال درآید.

«در همه جاندارانی که»

- ۱ با ریشه گیاهان رابطه همزیستی دارند، رنای پیک در حین یا پس از رونویسی دستخوش پیرایش می‌شود.
- ۲ می‌توانند ناقل همانندسازی را دریافت و تکثیر کنند، نوعی رنا (RNA)، در کاهش انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها نقش دارد.
- ۳ با استفاده از بخش‌های رویشی تکثیر می‌یابند، مولکول‌های حامل الکترون در ماده زمینه سیتوپلاسم یاخته تولید می‌شوند.
- ۴ فام‌تن (کروموزوم) اصلی موجود در سیتوپلاسم آنها به غشای یاخته اتصال دارد، آنزیم رنابسپاراز، راه‌انداز تمام ژن‌ها را شناسایی می‌کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در گیاهان، تجزیه گلوکز می‌تواند از طریق تنفس یاخته‌ای هوازی، تخمیر الکلی یا تخمیر لاکتیکی رخ دهد. منظور از یون مثبت می‌تواند مولکول‌های مقابل باشد: H^+ , NAD^+ , $NADP^+$ بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: در قندکافت: هنگام تبدیل فروکتوز دو فسفات به قند سه‌کربنه تک‌فسفات، یون مثبتی آزاد نمی‌شود.
گزینه ۲: در قندکافت: هنگام تبدیل قند سه‌کربنه تک‌فسفات به اسید سه‌کربنه دو فسفات، آزاد شدن یون H^+ را به همراه تولید $NADH$ خواهیم داشت.
گزینه ۳: در کربس: در طی تبدیل مولکول ۶ کربنه به ۵ کربنه، یک مولکول CO_2 آزاد می‌شود، بنابراین مولکول ۵ کربنه نسبت به ۶ کربنه اتم اکسیژن کمتری دارد. در این واکنش نیز آزاد شدن یون H^+ را به همراه تولید $NADH$ خواهیم داشت.
گزینه ۴: در قندکافت: هنگام تبدیل قند سه‌کربنه تک‌فسفات به اسید سه‌کربنه دو فسفات، آزاد شدن یون H^+ را به همراه تولید $NADH$ خواهیم داشت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. منظور صورت سؤال، سومین پمپ موجود در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری است.
گزینه ۱: این پمپ با ترکیب یون‌های اکسید و پروتون‌ها مولکول‌های آب را تشکیل می‌دهد و مانع تشکیل رادیکال‌های آزاد از اکسیژن می‌شود. به عبارتی زحمت پاداکسنده‌ها را کمتر می‌کند!
گزینه ۲: منظور شیب غلظت پروتون‌ها است که به طور غیرمستقیم سبب تولید ATP شده و یاخته را زنده نگه می‌دارد تا فرایندهای زنجیره انتقال الکترون قابل انجام باشند.
گزینه ۳: قسمت عمده این ساختار، در عرض غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.
گزینه ۴: فقط پمپ اول پروتون می‌تواند از $NADH$ مستقیماً الکترون دریافت کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اشاره به ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم و اندامک میتوکندری دارد. بررسی گزینه‌ها:
گزینه ۱: در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم همانند میتوکندری شاهد کاهش مولکول پذیرنده الکترون (NAD^+) هستیم.
گزینه ۲: این مولکول تنها در طی فرایند گلیکولیز در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم تولید می‌شود.
گزینه ۳: تولید کربن دی‌اکسید تنها در میتوکندری انجام می‌شود.
گزینه ۴: مولکول ۵ کربنه تنها در چرخه کربس درون میتوکندری ایجاد می‌شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منظور صورت سؤال، سومین پمپ موجود در زنجیره انتقال الکترون است. بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: درست است. منظور شیب غلظت پروتون‌ها است که سبب تولید ATP شده و یاخته را زنده نگه می‌دارد تا فرایندهای زنجیره انتقال الکترون قابل انجام باشند.
گزینه ۲: نادرست است. گاه پیش می‌آید که درصدی از اکسیژن‌ها وارد واکنش تشکیل آب نمی‌شوند، بلکه به صورت رادیکال آزاد در می‌آیند. همچنین، سیانید یکی از این ترکیب‌هایی است که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون‌ها به اکسیژن را مهار می‌کند و در نتیجه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می‌شود. کربن مونوکسید هم، همین نقش را می‌تواند داشته باشد.
گزینه ۳: قسمت عمده این پمپ، در فضای بین دو لایه غشای درونی راکیزه قرار دارد.
گزینه ۴: منظور $NADH$ است که الکترون‌های آن پس از طی کردن بخشی از زنجیره انتقال الکترون، به سومین پمپ می‌رسند.

۵

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قبل از تولید ATP در آخرین بخش چرخه کربس، کربن دی اکسید تولید می شود. دقت کنید بیشترین مقدار کربن دی اکسید به شکل محلول در خون حمل می شود. بررسی سایر گزینه ها: گزینه ۱: آخرین مولکول چهارکربنی در انتهای چرخه تولید می شود و بعد از تولید ATP ایجاد می شود. گزینه ۲: مطابق شکل بعد از تولید ATP، $NADPH$ و $FADH_2$ تولید می شود. گزینه ۳: قبل از تولید ATP، کوآنزیم A آزاد می شود.

۶

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فقط بخش آنزیمی ATP می سازد و آن را به درون میتوکندری رها می کند. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: هر دو بخش سازنده آنزیم از اتصال قطعات مجزا به هم ساخته شده است. گزینه ۲: دقت کنید هر دو بخش به عبور پروتون ها از غشای داخلی راکیزه کمک می کند. گزینه ۴: هیچیک از بخش های آنزیم ATP ساز نمی تواند الکترون بگیرد یا از دست بدهد.

۷

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. منظور، مولکول های $NADH$ و $FADH_2$ است. بررسی گزینه ها:

گزینه ۱: صحیح است. $NADH$ و $FADH_2$ نوکلئوتیدهایی هستند که در ساختار خود تعدادی اتم اکسیژن دارند. گزینه ۲: غلط است - $NADH$ برخلاف $FADH_2$ طی گلیکولیز تولید می شود. گزینه ۳: غلط است - این مولکول ها در زنجیره انتقال الکترون مصرف می شوند نه تولید! گزینه ۴: غلط است - از $NADH$ و $FADH_2$ برخلاف ATP در تجزیه مولکول های درشت و تبدیل آنها به مولکول های کوچک تر استفاده نمی شود.

۸

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دقت کنید در صورت سؤال گفته شده به ازای هر ترکیب غیرقندی سه کربنی دوفسفاته! در واقع باید تعداد NAD^+ های مصرفی نصف شود. پس از شروع گلیکولیز تا زمان تولید اسید سه کربنی دوفسفاته، ۲ مولکول ATP و یک مولکول NAD^+ مصرف می شود و دو مولکول ADP تولید می شود.

۹

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. آنزیم ATP در غشای داخلی قرار دارد. یون هیدروژن با پمپ شدن به فضای بین دو غشا وارد می شود. سیانید آخرین واکنش زنجیره را متوقف می کند.

۱۰

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تارهای ماهیچه ای قرمز (کند) مقدار رنگدانه ای قرمز بیش تر است. در این تارها میزان تنفس یاخته ای هوازی زیاد است. در نتیجه فعالیت آنزیم های مؤثر در چرخه کربس مهار نشده است. بلکه فعالیت زیادی برای تولید مقدار ATP مورد نیاز یاخته دارد. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: در تارهای سریع (سفید) فعالیت آنزیم تجزیه کننده ی ATP سر میوزین بیش تر از تارهای کند است. تارهای تند در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند.


گزینه ۳: در طی تنفس هوازی مقدار انرژی بیش تری آزاد شده است. این مورد در تارهای کند بیش تر است. تارهای کند با سرعت کمتری منقبض می شود.

گزینه ۴: در تارهای سریع سرعت آزاد شدن یون های کلسیم بیش تر است. در سیتوپلاسم این سلول ها، میتوکندری کمتری وجود دارد زیرا این یاخته ها بیش تر تنفس بی هوازی انجام می دهند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: زنجیره انتقال الکترون، یون‌های هیدروژن را در خلاف شیب غلظت به فضای بین دو غشای داخلی و خارجی پمپ می‌کند، پس نمی‌توانیم بگوییم یون‌های هیدروژن را در جهت یا خلاف جهت عبور می‌دهد. دقت کنید که پروتئین کانالی که ATP می‌سازد یون‌ها را در جهت شیب غلظت عبور می‌دهد ولی جزء زنجیره انتقال الکترون محسوب نمی‌شود.

گزینه ۲: لزوماً همه‌ی ترکیب‌های گیرنده یا دهنده‌ی الکترون، در بین دو لایه غشای درونی میتوکندری قرار ندارند. گزینه ۳: هر ترکیب دریافت‌کننده‌ی الکترون، یون هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمی‌کند. گزینه ۴: انرژی الکترون‌های عبوری از زنجیره، صرف تلمبه کردن یون‌های هیدروژن به بخش خارجی (نه داخلی) میتوکندری می‌شود.



گزینه ۱ پاسخ صحیح است. فقط مورد اول به درستی بیان شده است.

برای تولید ترکیب دو کربنی دو نوع واکنش تخمیر الکلی و اکسایش پیرووات انجام می‌گیرد. به منظور انجام این واکنش‌ها از چهارمین گام گلیکولیز تا تولید مولکول دو کربنی در این واکنش‌ها، مولکول ADP مصرف شده و مولکول CO_2 نیز قطعاً تولید می‌شود. در مورد سایر گزینه‌ها: NAD^+ , NADH در گام سوم گلیکولیز مشاهده می‌شوند و ارتباطی با گام چهارم ندارند. دقت کنید اگر ترکیب دو کربنه بنیان استیل باشد آن‌گاه مولکول NAD^+ مصرف و NADH تولید می‌شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه‌ها:

۱: پاداکسندها به رادیکال‌های آزاد الکترون می‌دهند و باعث خنثی شدن آن‌ها می‌شوند. در واقع باعث پایدار شدن رادیکال‌های آزاد می‌شوند. در حقیقت پاداکسندها الکترون خود را به رادیکال آزاد می‌دهند.

۲: دقت کنید پیرووات ممکن است به روش بی‌هوازی در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم مصرف شود. پس می‌تواند وارد میتوکندری نشود.


۳: سه نوع پروتئین سراسری در غشای میتوکندری باعث پمپ یون‌های هیدروژن به فضای بین غشایی میتوکندری می‌شوند.

۴: صحیح است.

نوکلئیک اسیدها که شامل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (دنا) و ریبونوکلئیک اسید (رنا) هستند، همگی بسپارهایی (پلیمرهایی) از واحدهای تکرارشونده به نام نوکلئوتید هستند. با توجه به شکل، هر نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنج کربنه، یک باز آلی نیتروژن دار و یک سه گروه فسفات.

قند پنج کربنه در دنا، دئوکسی ریبوز و در رنا، ریبوز است. دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد. باز آلی نیتروژن دار می تواند پورین باشد که ساختار دو حلقه ای دارد؛ شامل آدنین (A) و گوانین (G) یا می تواند پیریمیدین باشد که ساختار تک حلقه ای دارد؛ شامل تیمین (T) سیتوزین (C) و یوراسیل (U). در دنا باز یوراسیل شرکت ندارد و به جای آن تیمین وجود دارد و در رنا به جای تیمین، باز یوراسیل وجود دارد. برای تشکیل یک نوکلئوتید، باز آلی نیتروژن دار و گروه یا گروه های فسفات با پیوند اشتراکی (کووالانسی) به دو سمت قند متصل می شود.

نکته: هر نوکلئوتید در ساختار نوکلئیک اسید قرار ندارد مثل نوکلئیدهای آزاد.
نکته: برای مثال ATP حاصل از گلیکولیز، حاصل از مرحله غیرهوازی تنفس یاخته ای است.



شکل ۳- اجزای یک نوکلئوتید

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. آنتی اکسیدان ها بر ضد اکسیدان ها عمل می کنند. در واقع با اکسایش یافتن خود، مانع آسیب به دنا می شوند. بررسی سایر گزینه ها:

- گزینه ۱: دقت کنید تشکیل آب در بخش درونی میتوکندری انجام می شود.
گزینه ۲: در زمانی که تخمیر لاکتیکی انجام می شود، پیرووات به میتوکندری وارد نمی شود.
گزینه ۴: ممکن است این انرژی از ترکیبات دیگری مانند اسیدهای چرب تأمین شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. منظور از تارهای ورزشکار دوی استقامت، تارهای کند و تارهای ورزشکار وزنه بردار حرفه ای، تارهای تند است. دقت کنید در تارهای کند انقباض به آهستگی رخ می دهد؛ در نتیجه سرعت نشت کلسیم به ماده زمینه ای سیتوپلاسم کندتر است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: تارهای کند تنفس هوازی بیشتری انجام می دهند؛ در نتیجه نیاز به شبکه مویرگی گسترده تری در اطراف تارهای خود دارند.

گزینه ۲: تارهای کند به علت نیاز بیشتر به اکسیژن، میزان میوگلوبین بیشتری دارند.

گزینه ۴: تارهای کند تنفس هوازی بیشتری انجام می دهند، در نتیجه آنزیم های مربوط به زنجیره انتقال الکترون بیشتری دارند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دلیل رد سایر گزینه‌ها:

۱۷

گزینه ۱: تشکیل آب در فضای درونی میتوکندری انجام می‌شود نه در فضای بین دو غشای راکیزه!

گزینه ۲: ممکن است تخمیر صورت گیرد که در سیتوپلاسم انجام می‌شود.

گزینه ۳: اکسایش یافتن نه کاهش یافتن!

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. منظور صورت سؤال، یاخته‌هایی در بدن انسان است که دی‌اکسید کربن را طی تنفس

۱۸

هوازی تولید می‌کنند. دقت کنید در بدن انسان تخمیر الکلی رخ نمی‌دهد؛ مثلاً در اسپرم فروکتوز، در عضلات علاوه

بر گلوکز، اسید چرب نیز مصرف می‌شود. همچنین در گویچه‌های قرمز نیز از ترکیب بی‌کربنات و یون هیدروژن،

دی‌اکسید کربن آزاد می‌شود. این گزینه تنها درباره یاخته‌های دارای تنفس هوازی صادق است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: این مورد به تولید پیرووات از اسید سه کربنی اشاره دارد. در همه یاخته‌های زنده بدن انسان قندکافت رخ

می‌دهد.

گزینه ۲: در اولین مرحله از قندکافت، گلوکز و ATP مصرف می‌شود. گلوکز می‌تواند در نتیجه آبکافت قندهای بزرگ‌تر

ایجاد شود. بنابراین این گزینه در مورد همه یاخته‌های زنده بدن درست است.


گزینه ۴: در همه این یاخته‌ها، اجزای زنجیره انتقال الکترون که الکترون‌های حاملین الکترون را دریافت می‌کنند؛

آنزیم هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. منظور صورت سؤال، دومین عضو زنجیره انتقال الکترون است که از هر دو حامل الکترون،

۱۹

الکترون دریافت می‌کند. این بخش، ابتدا الکترون‌ها را به دومین پمپ پروتئینی منتقل می‌کند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: این عضو، پمپ نمی‌باشد و در جابه‌جایی یون‌های هیدروژن برخلاف شیب غلظت نقش ندارد.

گزینه ۲: این مورد درباره آخرین عضو زنجیره انتقال الکترون صادق است.

گزینه ۴: این مورد درباره آخرین عضو زنجیره انتقال الکترون صادق است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. باکتری‌ها و قارچ‌ها با ریشه گیاهان رابطه همزیستی دارند. دقت کنید فرایند پیرایش

۲۰

مربوط به یوکاریوت‌ها می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲: همه یاخته‌ها می‌توانند ناقل همانندسازی را دریافت کنند. در همه این یاخته‌ها آنزیم‌هایی از جنس رنا

مشاهده می‌شود.

گزینه ۳: گیاهان با استفاده از بخش‌های رویشی تکثیر می‌شوند. در همه جانداران زنده، در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم

در پی گلیکولیز NADH تولید می‌شود.

گزینه ۴: منظور باکتری‌ها می‌باشد. دقت کنید در برخی ژن‌ها که خاموش هستند، آنزیم رنابسپاراز راه‌انداز آن ژن‌ها را

شناسایی نمی‌کند.

۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴

