


تمرین های دوره ای

۱- برای هر یک از موارد زیر دلیلی بیاورید.

(آ) اسیدها و بازها با ثابت یونش کوچک، الکترولیت ضعیف به شمار می روند. یونش ↓ - غلظت یون ها ↓



(ب) اغلب اسیدها و بازهای شناخته شده، ضعیف هستند.

(پ) در محلول ۱/۱ مولار نیتریک اسید در دمای اتاق، $[\text{NO}_3^-] = 1 \text{ mol L}^{-1}$ است.

(ت) در محلول ۱/۱ مولار فورمیک اسید، $[\text{HCOOH}] > [\text{H}^+]$ است.

اسه ← یونیده نشده - تعالی

۲- کاغذ pH بر اثر آغشته شدن به نمونه ای از یک محلول، به رنگ سرخ در می آید. همچنین رسانایی الکتریکی

این محلول در شرایط یکسان به طور آشکاری از محلول آبی سدیم کلرید کمتر است. این محلول محتوی کدام


* اسید - ضعیف

ماده حل شونده می تواند باشد؟ توضیح دهید.

الکترولیت قوی

~~CH₃OH~~, ~~KOH~~, HCOOH, ~~HCl~~, ~~NH₃~~ ← غیرالکترولیت!

۳- در دما و غلظت یکسان، هر یک از شکل های زیر به کدام یک از محلول ها تعلق دارد؟ چرا؟



(آ) محلول استیک اسید ($K_a = 1/8 \times 10^{-5}$).

(ب) محلول هیدروبرمیک اسید (K_a بسیار بزرگ).

(پ) محلول هیدروسیانیک اسید ($K_a = 4/9 \times 10^{-10}$).

(۱) (۲) (۳)

HCN CH₃COOH HBr

عکس کاغذ pH

۴- رنگ گل ادریسی به میزان اسیدی بودن خاک بستگی دارد. این گل در خاکی که غلظت یون هیدرونیوم آن

$4 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$ است به رنگ آبی اما در خاک دیگری که غلظت یون هیدرونیوم $2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ است به رنگ

سرخ شکوفا می شود. pH این دو نوع خاک را حساب کنید.

$[H^+] > 10^{-7}$
اسیدی!


$[H^+] < 10^{-7}$
بازی



$$pH = -(2\log 2 - 9) = 8.4$$

$$pH = -(\log 2 - 5) = 4.7$$


۵- به شکل (آ) توجه کنید:




(آ) حجم محلول

$K_w = [OH^-] \times [H_3O^+]$ ثابت فواریوش آب
آسه فقط به دما!


دانش آموزی برای نشان دادن ارتباط بین حاصل ضرب غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید با حجم محلول، شکل های ب تا ت را پیشنهاد داده است. کدام یک از این شکل ها ارتباط بین کمیت های داده شده را به درستی نشان می دهد؟



(ت)



(پ)



(ب)

اسیدی! $[H^+] > [OH^-]$

۶- در نمونه ای از عصاره گوجه فرنگی، غلظت یون هیدرونیوم 4×10^{-6} برابر غلظت یون هیدروکسید است. pH آن را حساب کنید و در جای خالی بنویسید.



$$[H^+] = 4 \times 10^{-6} \times [OH^-]$$

$$[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$$

$$[H^+] \times \frac{[H^+]}{4 \times 10^{-6}} = 10^{-14} \Rightarrow [H^+]^2 = 4 \times 10^{-8} \Rightarrow [H^+] = 2 \times 10^{-4}$$

$$pH = -(\log 2 - 4) = 3.7$$

$pH = 4.7 \rightarrow [H^+] = 10^{-4.7} \rightarrow 10^{-5} \times 10^{0.3} \rightarrow [H^+] = 2 \times 10^{-5}$
 $[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14} \rightarrow 2 \times 10^{-5} \times [OH^-] = 10^{-14} \rightarrow [OH^-] = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-5}} = \frac{10^{-9}}{2}$
 $\frac{2 \times 10^{-5}}{\frac{10^{-9}}{2}} = 4 \times 10^4$

pH ۷- یک نمونه از آب سیب برابر با ۴/۷ است. نسبت غلظت یون های هیدرونیوم به یون های هیدروکسید را در این نمونه حساب کنید.

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

۸- شکل های زیر ۵۰ میلی لیتر از محلول آبی دو حل شونده متفاوت را نشان می دهد.

$\alpha = 1$
 $[H^+] = \frac{n_{H^+}}{V} = \frac{(1 \times 10^{-3}) \text{ mol}}{0.15 \text{ L}} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
 $pH = -(\log 2 - 2) = 1.7$

(۱)

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$
 $\begin{matrix} a & & -x & +x & +x \\ & & a-x & x & x \end{matrix}$
 $\alpha = \frac{1}{10} = 0.1$
 $a - 1 = 9 \rightarrow a = 10$
 $[H^+] = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0.15 \text{ L}} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$
 $pH = -(\log 2 - 3) = 2.7$

(۲)

(آ) این نوع حل شونده ها اسید آرنیوس هستند یا باز آرنیوس؟ چرا؟ $[H_3O^+]$

(ب) درجه یونش و pH را برای هر یک از آنها حساب کنید (هر ذره را ۱۰۰٪ مول از آن گونه در نظر بگیرید).


۹- HX و HY دو اسید ضعیف هستند. اگر ۱۲ گرم از HX و ۸ گرم از HY جداگانه در یک لیتر آب حل شوند، pH این دو محلول برابر خواهد شد. با مقایسه درجه یونش آنها مشخص کنید کدام اسید قوی تری است؟ چرا؟

برای $[H^+]$ برابر

(۱ mol HX = ۱۵۰ g, ۱ mol HY = ۵۰ g) (صفت خالی!)

۱۰- یک کارشناس شیمی، pH نمونه هایی از ۲۰۰ لیتر محلول تهیه شده (۱ و ۲) را اندازه گیری کرده است. حساب کنید، چه جرمی از هر ماده حل شونده به ۲۰۰ لیتر آب افزوده شده است؟ از تغییر حجم چشم پوشی کنید.

$pH = 12 \rightarrow [H^+] = 10^{-12}$



$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$ (۱)

$? g HNO_3$

$? \text{ mol } H^+ = 2 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 200 \text{ L} = 4 \times 10^{-3} \text{ mol } H^+$

$? g HNO_3 = 4 \times 10^{-3} \text{ mol } H^+ \times \frac{1 \text{ mol } HNO_3}{1 \text{ mol } H^+} \times \frac{63 \text{ g } HNO_3}{1 \text{ mol } HNO_3} = 252 \text{ g } HNO_3$

آب خالص


$KOH \rightarrow K^+ + OH^-$ (۲)

$? g KOH$

$? \text{ mol } OH^- = 10^{-2} \text{ mol} \times 200 \text{ L} = 2 \text{ mol } OH^-$

$? g KOH = 2 \text{ mol } OH^- \times \frac{1 \text{ mol } KOH}{1 \text{ mol } OH^-} \times \frac{56 \text{ g } KOH}{1 \text{ mol } KOH} = 112 \text{ g } KOH$

۱۱- با توجه به شکل زیر که نمای ذره‌ای از یک واکنش را نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.




آ) هر یک از جاهای خالی را با فرمول شیمیایی مناسب پر کنید.

ب) از واکنش ۱۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۲٪ مول بر لیتر با مقدار کافی از سدیم هیدروژن

کربنات، چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در STP تولید می‌شود؟

$$? \text{ mL CO}_2 = 0.1 \text{ L HCl} \times \frac{1 \text{ mol HCl}}{1 \text{ L HCl}} \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol HCl}} \times \frac{22400 \text{ mL CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 4480 \text{ mL CO}_2$$

۱۲- ثابت یونش برای محلول‌های $\text{BOH}(\text{aq})$ و $\text{B'OH}(\text{aq})$ در دمای اتاق به ترتیب برابر با 10^{-5} و 10^{-4} است.



آ) کدام یک باز قوی‌تری است؟ چرا؟ $\uparrow K_b - \text{BOH}$

ب) pH کدام محلول کمتر است؟ چرا؟
 $\downarrow \text{pH} \leftarrow \downarrow [\text{OH}^-] \leftarrow \text{BOH} \leftarrow \text{باز ضعیف‌تری}$