

۱ اگر a, b دو عدد صحیح و ab فرد باشد، باقی‌مانده $5 - a^2 + b^2$ بر ۸ را حساب کنید.

۲ اگر در یک تقسیم، مقسوم و مقسوم‌علیه هر دو بر عدد صحیح n بخش‌پذیر باشند، ثابت کنید باقی‌مانده تقسیم نیز همواره بر n بخش‌پذیر است.

۳ درست یا نادرست بودن گزاره‌های زیر را مشخص کنید.
 الف) حاصل‌ضرب هر عدد گویا، در یک عدد گنگ، عددی گنگ است.
 ب) برای اعداد صحیح a, b و c که $a \neq 0$ ، اگر $a|b + c$ یا $a|b$ یا $a|c$ ،
 ج) معادله هم‌نهشتی $ax \equiv b \pmod{m}$ دارای جواب است اگر و فقط اگر $(a, m)|b$.
 د) اگر داشته باشیم $(a, b) = 1$ آن‌گاه می‌گوییم a و b نسبت به هم اول‌اند.

۴ اگر عددی مانند k در Z باشد به طوری که $1 + 2k \nmid 49$ ، ثابت کنید: $49 \nmid 4k^2 - 10k - 6$

۵ معادله هم‌نهشتی $10 \equiv 4x \pmod{6}$ را در صورت امکان حل کرده و مجموعه جواب آن به دست آورید.

۶ اگر a و b عددی صحیح و فرد باشد و در این صورت باقیمانده تقسیم عدد $(a^2 + b^2 + 5)$ را بر ۸ بیابید.

۷ باقی‌مانده تقسیم عدد $1! + 2! + 3! + 4! + 5! + \dots + 200!$ بر ۱۵ به دست آورید. (! نماد فاکتوریل می‌باشد).

۸ اگر دو عدد $(3a - 5)$ و $(4a - 7)$ رقم یکان برابر داشته باشند، رقم یکان عدد $(9a + 6)$ را به دست آورید.

۹ رقم یکان عدد $(2^{11} + 7)$ را به دست آورید.

۱۰ معادله هم‌نهشتی $20 \equiv 8x \pmod{12}$ را حل کرده و جواب عمومی آن را به دست آورید.

۱۱ ثابت کنید حاصل‌ضرب سه عدد صحیح متوالی همواره بر $3!$ بخش‌پذیر است.

۱۲ اگر در یک سال، شنبه روز اول مهر باشد، در این صورت با استفاده از هم‌نهشتی تعیین کنید ۱۲ بهمن، در همان سال چه روزی از هفته است؟

۱۳ حکم زیر را به روش خواسته شده اثبات کنید.
برای هر دو عدد حقیقی مثبت x, y نشان دهید: $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ (اثبات بازگشتی)

۱۴ با استدلال برهان خلف ثابت کنید که اگر $\sqrt{3}$ عددی گنگ است، $\sqrt{\sqrt{3} + 2}$ نیز عددی گنگ است.

۱۵ اگر مجموع دو عدد 10^2 و کوچک‌ترین مضرب مشترک آن‌ها 432 باشد، بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد را بیابید.

۱۶ اگر a و b و c سه عدد حقیقی باشند، ثابت کنید:
$$a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a + b + c)$$

۱۷ برای هر دو عدد حقیقی و مثبت x و y ثابت کنید:
$$y^2 + 1 \geq 2x(y - x + 1)$$

۱۸ اگر $a, b \in \mathbb{Z}$ و $m, n \in \mathbb{N}$ ثابت کنید:
$$m \leq n, a|b \Rightarrow a^m|b^n$$

۱۹ ثابت کنید:
الف) هر دو عدد صحیح و متوالی نسبت به هم اول‌اند.
ب) هر دو عدد صحیح و فرد متوالی نسبت به هم اول‌اند.
(راهنمایی: فرض کنید $(m, m+1) = d$ و ثابت کنید $d|1$ و نتیجه بگیرید $d=1$).

۲۰ ثابت کنید اگر $(a, b) = 1$ و $(a, c) = 1$ باشند، آنگاه $(a, bc) = 1$



۱ راه اول: ab فرد است لذا هر دو عدد a, b فرد می‌باشند.

$$\begin{aligned} a &= 2k + 1 \\ b &= 2k' + 1 \\ \Rightarrow a^r + b^r - 5 &= 2^r k^r + 2^r k + 1 + 2^r k'^r + 2^r k' + 1 - 5 = 2^r k(k+1) + 2^r k'(k'+1) - 3 \\ &= 2^r q'' - 3 = 2^r (q'' - 1) + 5 = 2^r t + 5 \Rightarrow r = 5 \end{aligned}$$

راه دوم: ab فرد است لذا هر دو عدد a, b فرد می‌باشند.

$$\begin{aligned} a &= 2k + 1 \Rightarrow a^r \equiv 1 \pmod{2} \\ b &= 2k' + 1 \Rightarrow b^r \equiv 1 \pmod{2} \\ \Rightarrow a^r + b^r &\equiv 2 \pmod{2} \Rightarrow a^r + b^r - 5 \equiv -3 \equiv 5 \pmod{2} \Rightarrow r = 5 \end{aligned}$$

۲ با فرض $a = nk$ و $b = nk'$ داریم:

$$a = bq + r \Rightarrow nk = nk'q + r \Rightarrow nk - nk'q = r \Rightarrow r = n \underbrace{(k - k'q)}_{q''} \Rightarrow n | r$$

۳ الف) نادرست (ص ۵) ب) نادرست (ص ۱۱) ج) درست (ص ۲۵) د) درست (ص ۱۳)

$$v | 2k + 1 \Rightarrow \begin{cases} 29 | 2k^r + 2k + 1 \\ 29 | 12k + 7 \end{cases} \Rightarrow 29 | 2k^r - 10k - 6 \quad (\text{ص } ۱۶)$$

۵ چون $20 | (12, 8)$ معادله جواب دارد. (ص ۳۰)

$$2x \equiv 10 \pmod{29} \Rightarrow 2x \equiv 2 \pmod{29} \Rightarrow x \equiv 1 \pmod{29} \Rightarrow x = 29k + 1$$

۶ می‌دانیم مربع هر عدد فرد، به صورت $8k + 1$ می‌باشد ($k \in \mathbb{Z}$) پس داریم: (ص ۱۶)

$$\begin{cases} a^r = 8k + 1 \\ b^r = 8k' + 1 \end{cases} \Rightarrow a^r + b^r + 5 = 8k + 1 + 8k' + 1 + 5 \Rightarrow a^r + b^r + 5 = 8k'' + 7 \Rightarrow r = 7$$

۷ می‌دانیم $1 \equiv 1! \pmod{15}$ و $2 \equiv 2! \pmod{15}$ و $3 \equiv 3! \pmod{15}$ و $4 \equiv 4! \pmod{15}$ و $5 \equiv 5! \pmod{15}$ و ... $20 \equiv 20! \pmod{15}$ پس داریم: (ص ۲۹)

$$1! + 2! + 3! + 4! + 5! + \dots + 20! \equiv 1 + 2 + 6 + 24 + 0 + \dots + 0 \equiv 3 \pmod{15}$$

$$2a - 7 \equiv 2a - 5 \pmod{29} \Rightarrow a \equiv 2 \pmod{29} \Rightarrow 9a + 6 \equiv 24 \equiv 4 \pmod{29} \Rightarrow r = 4 \quad (\text{ص } ۲۹)$$

$$2^5 \equiv 2 \pmod{15} \Rightarrow 2^{10} \equiv 2^2 \pmod{15} \Rightarrow 2^{11} \equiv 8 \pmod{15} \Rightarrow 2^{11} + 7 \equiv 15 \equiv 0 \pmod{15}$$

رقم یکان برابر ۵ است. (ص ۲۹)

$$2x \equiv 20 \pmod{29} \xrightarrow{(\cdot, 29)=1} x \equiv 10 \pmod{29} \Rightarrow x = 29k + 10 \quad (\text{ص } ۳۰)$$

$$A = \underbrace{(n+1)(n+2)(n+3)}_{\text{ضرب ۳ عدد متوالی}} = \frac{(n+3)!}{n!}$$

۱۱

$$\binom{n+3}{3} = q \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{(n+3)!}{3! \times n!} = q \Rightarrow \frac{(n+3)!}{n!} = 6q \Rightarrow A = 6q \Rightarrow 6|A$$

روز اول مهر، شنبه را برابر صفر در نظر می‌گیریم ۲۹ روز در مهر و سه ماه آبان و آذر و دی و ۱۲ بهمن، فاصله اول مهر تا ۱۲ بهمن است، پس داریم:

۱۲

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶

(۰/۲۵)

$$29 + 30 + 30 + 30 + 12 = 131 \rightarrow 131 \stackrel{v}{\equiv} 5 \quad (۰/۵)$$

(صفحه ۲۴)

که متناظر این عدد در جدول روز پنج‌شنبه را نشان می‌دهد. (۰/۲۵)

$$(x+y)^2 \geq 4xy \quad (۰/۲۵) \Rightarrow x^2 + y^2 + 2xy \geq 4xy \Rightarrow x^2 + y^2 - 2xy \geq 0 \quad (۰/۲۵)$$

۱۳

$$\Rightarrow (x-y)^2 \geq 0 \quad (۰/۲۵)$$

رابطه بدیهی است و تمامی مراحل بازگشت‌پذیر است. (۰/۲۵) صفحه ۲۱

$$\sqrt{\sqrt{3}+2} \notin Q' \Rightarrow \sqrt{\sqrt{3}+2} = \frac{a}{b} \Rightarrow \sqrt{3}+2 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{a^2}{b^2} - 2 \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{a^2 - 2b^2}{b^2}$$

۱۴

به تناقض رسیده‌ایم و همان حکم اولیه برقرار است.

$$a'd + b'd = 102 \rightarrow d(a' + b') = 102 \quad (I)$$

که $(a', b') = 1$

۱۵

$$c = \frac{ab}{d} \rightarrow 432d = a'db'd \rightarrow 432 = a'b'd$$

$$\frac{d(a'+b')}{da'b'} = \frac{102}{432} \rightarrow \frac{a'+b'}{a'b'} = \frac{17}{72} \Rightarrow 432 = 72d \Rightarrow d = \frac{432}{72} = 6$$

$$\begin{cases} a' + b' = 17d(a'+b')=102 \\ a'b' = 72 \end{cases} \rightarrow d = 6$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2a + 2b + 2c \Leftrightarrow$$

۱۶

$$a^2 + b^2 + c^2 + 1 + 1 + 1 - 2a - 2b - 2c \geq 0 \Leftrightarrow (۰/۲۵)$$

$$(a^2 - 2a + 1)(b^2 - 2b + 1) + (c^2 - 2c + 1) \geq 0 \Leftrightarrow (۰/۲۵)$$

$$(a-1)^2 + (b-1)^2 + (c-1)^2 \geq 0$$

عابرت همواره درست است و بر طبق استدلال برگشتی برقرار می‌باشد. (۰/۲۵)

$$y^2 + 1 \geq 2xy - 2x^2 + 2x \rightarrow y^2 + 1 - 2xy + 2x^2 - 2x \geq 0$$

۱۷

$$y^2 - 2xy + x^2 + x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

$$(y-x)^2 + (x-1)^2 \geq 0 \quad \text{اثبات بازگشتی: بدیهی}$$

$$a|b \xrightarrow{\text{توان } m} a^m|b^m \xrightarrow{\text{راست } \times b^{n-m}} a^m|b^m \times b^{n-m} \Rightarrow a^m|b^n$$

۱۸

توجه: $x|y \Rightarrow x|ky$

الف) گیریم: ۱۹

$$m \in \mathbb{Z}, (m, m+1) = d \Rightarrow d|m \wedge d|m+1 \xrightarrow{\text{تفریق}} d|(m+1) - m \Rightarrow d|1 \xrightarrow{d>0} d=1$$

ب) گیریم:

$$k \in \mathbb{Z}, (2k+1, 2k+3) = d \Rightarrow d|2k+1 \wedge d|2k+3 \xrightarrow{\text{تفریق}} d|(2k+3) - (2k+1)$$

$$\Rightarrow d|2 \xrightarrow{\text{زوج نیست } d} d=1$$

$$(a, b) = 1 \Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z} ; ma + nb = 1 \quad (1)$$

$$(a, c) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z} ; xa + yc = 1 \quad (2)$$

$$(1) \times (2) \Rightarrow mxa^r + nyac + nxab + nybc = 1 \Rightarrow a(max + myc + nxb) + bc(ny) = 1$$

$$\Rightarrow at + (bc)p = 1 \Rightarrow (a, bc) = 1$$

۲۰



